

Jo
Ferguson

8
1/2

Tractatus, (cui Titulus, *Processus Integri in Morbis ferè omnibus curandis*)
a Clarissimo D. D. Thomâ Sydenham
conscriptus, Imprimatur.

Thomas Burwell, Præses.

Humphrey Brook,

Jos. Clerk,

Guilelmus Briggs,

Fredr. Slare.

} Censores

Datum 18^o Die Augusti
A. D. 1693. in Comi-
tiis Censoriis ex Ædi-
bus Collegii nostri.

Jo
Ferguson

8
1/2

Tractatus, (cui Titulus, *Processus Integri in Morbis ferè omnibus curandis*)
a Clarissimo D. D. Thomâ Sydenham
conscriptus, Imprimatur.

Thomas Burwell, Præses.

Humphrey Brook,

Jos. Clerk,

Guilelmus Briggs,

Fredr. Slare.

} Censores

Datum 18^o Die Augusti
A. D. 1693. in Comi-
tiis Censoriis ex Ædi-
bus Collegii nostri.

PROCESSUS INTEGRI

I N

M O R B I S

Ferè Omnibus

C U R A N D I S,

A

D^o THOMA SYDENHAM, M.D.

Conscripti.

Quibus accessit graphica Symptomatum
delineatio, una cum quam plurimis
observatu dignis.

N E C N O N

De PHTHISI Tractatulo.

EDITIO QUINTA.

L O N D I N I:

Impensis J. KNAPTON ad Insigne Coronæ, &
GUIL. & JOH. INNYS ad Insignia Principis,
in Coemeterio D. Pauli.

MDCCLXXVI.

PROCESSES IN

IN

MORRIS

For Omnia

CURANDIS

AN

THE

CONSTITUTION

OF THE HUMAN BODY
AND THE EFFECTS OF
DISEASE


IN

THE

ART OF

THE
OF THE HUMAN BODY
AND THE EFFECTS OF
DISEASE

MDCCXXV



AMICE LECTOR,



SPECIMEN habes Præceos eximiae, in dilectissimi filii M. D. usum, cautè & diligenter excogitatum, suâ ipsius manu conscriptum, mihi autem pro familiaritate istâ quâ omnes excepit concessum à *Cl. Sydenham*, Viro sanè, cui vir ætas superior parem dederat, vel postera datura est, non modò in arte suâ mirâ sagacitate, & ingenii acumine singulari, conspicuo: sed & probis moribus, & in humanum genus studio & amore insignibus adè, ut apud omnes summum sui reliquerit desiderium: Cujus præcepta licet animo meo & imo pectore infixæ sint, nè tamen fortè fortunâ in mei ipsius & ægrorum detrimentum excidant memoriâ parùm fidâ, typis haud ita pridem mandabam, exemplaribus circiter viginti impressis, ut amicis quoque inservirem. Nescio autem quo pacto in lucem irrepsit publicam inter *Miscellanea Curiosa* superioris anni Norimbergæ editum;

L E C T O R I.

tum; sed ineptâ mole inutile. Prodiit tandem eo modo vestitum ut tibi sit in quovis loco paratum; figmentis cerebri vanis & futilibus sciolorum dogmatis nequaquam refertum, nec hypothefi placidâ solidis ut videtur rationum momentis undequaque constipatâ superbiens; humile autem & modestum accurate morbos depingit, & accuratiùs adhuc medetur; in id solum sollicitum, ut innotescat quod natura faciat aut ferat. Et si verum loqui liceat, modò partium situs noveris, pateant tibi per Symptomata ægritudines, (quod assiduâ ediscas observatione) scias deinde veram & genuinam medendi methodum per dietam & Pharmaciam adhibere, fœlicissimus eris practicus, & tibi & infirmis optimè consules. Parum interim tuâ refert utrum Alkali peccet an Acidum, num in Spiritibus animalibus, an in ipso sanguine, aut in recondito aliquo Viscere delitefcet morbi minera; unde de Periodico Intermittentium reditu doctè satis & prolixè possis differere; dum interea ipsa Febris sine ullis ambagibus, inquietudine, siti, calore, pulsa celeri, nausæâ, cæterisque Symptomatis, etiam astantibus palam est, & apertè dignoscitur: Hinc sæpius mirari subit, quamobrem anxie ita & scrupulosè immediatas & proximas morborum causas, dum Medicinam pertractandam suscipiunt, indagare satagunt, & è tenebris istis quibus natura obduxit, irritò licet conatu, eruere, gravi & subactò judicio viri

LECTORI.

viri & in praxi versatissimi; satis interim gna-
ri se latere vel quævis obvia. Unde enim di-
manat graminis viridis, aut albus nivis color?
Quid est quodd humana anima ratiocinari ne-
queat dum adhuc Infantes aut Pueri sumus?
Undè forma tua specifica? Satiùs esset Medi-
cum quàm Philosophum agere (quis enim un-
quam Cartesium sibi Medicum voluerit?) mi-
nutissima Phœnomena planè & ritè enume-
rare, & remedia quibus unusquisque morbus
faciliùs cedat, candido & sincero animo pro-
ponere; ita tandem limites suos prætergressa,
quibus angustis nimis jam includitur ars no-
bilissima, omnibus, quaquaversum patet orbis,
fœliciter satis & prosperè salutem, filiis autem
suis honores summos conciliabit.

Meditabatur paulò ante obitum, tractatum
de Phthisi peritissimus medicus; in perquiren-
do naturæ methodum, quâ morbos amoliri
studet, ut adjutrices porrigeret manus, & mi-
seriis hominum subveniret, diu noctuque pen-
sitabundo, & anxio animo, exercitatissimus;
hinc fidissimarum observationum serie & irre-
fragabili edoctus experienciâ, medicinæ praxin
ornavit, & ad saniores reduxit regulas; sed vœ
tabidis, dum hujusmodi nunquam intermissis
studiis detenti & defatigati spiritus, solitis non
vacabant excubiis, truculentissimus hostis, *Podagra*,
quæ per multos annos obsederat, & de-
bilitaverat artus, impetu facto in interiora vi-
scera irruit, per vomitum & secessum enor-

LECTORI.

miores intentans mortem: Unico autem morbo nescit cedere Medicorum Princeps, sed cum malorum cumulo accessit & *Renum Calculus*, qui corrasis valorum osculis, sanguinem liberalius, quàm senectus tulit, urinæ permixtum effudit, se jam non ampliùs opponens, nec vitæ, nec mortis cupidus, placidam, & pacatam, expiravit animam. Nè tamen auxilio prorsus destituantur tabidi, fragmenta quædam, quæ autorem ubivis sapiunt, in primo saltem morbi stadio plerumque proficua, (neque enim fas est, quod ægrotanti proximo opituletur, celare,) in publicum prodeunt; ut exindè pateat quàm accurata, & omnibus numeris absoluta, si modo Deus Opt. Maximus concessisset vitam, expectari potuisset Phthisiologia.

Quid in Febris, Variolis, Morbillis, acutis cæteris, ut & Chronicis sanandis valuit optimè meritis autor noster, sequentes indicant paginæ. Regimen & Diæta instituuntur aptissima; præscribuntur remedia pauca, sed necessaria; nec in Pharmacopolarum lucrum excogitata, nec inani ostentationi composita: sitibundis ægris (eodem modo quo & ipse sitim suam restinguere solitus erat) cerevisiam tenuem affatim & pro libitu hauriendam, unde mirè reficiuntur & refrigerantur, concedit; nec immanitate plùs quàm barbarâ, precibus eorum surdus, Apozemata & Julapia præ ingrato sapore fastidita substituit; maximam adhibet

LECTORI.

libet cautelam ne exæstuans nimis, vel igne
luculentiori, vel stragulorum onere, plùs adhuc
incalesceret, vel à propinatis forsan remediis
eum in finem, ut per poros eliminetur mate-
ria morbifica cruda adhuc & inconcocta, quæ
tamen hâc datâ ansâ concitato motu cere-
brum petit, undè Phrenesis aut Coma, aut ex-
travasato sanguine deturpant cutim maculæ
purpureæ, aut eruptiones, quas vocant milia-
res, collum & pectus ubivis obsident. Nun-
quid ad amussim magis depingi poterat quàm
Variolarum historia? eruptionis diem in utra-
vis specie designat, pustularum ingenium ad
unguem describit, quo tempore incipiat, &
quamdiu continuetur Salivatio, quo iterum fa-
ciei manuumque tumor se prodat; quid tan-
dem quolibet die expectandum, disertè expli-
cat. Paregoricorum usum, quo emolumento
judicent Practici, primus persuasit, malum,
ingerendi Cardiaca ante eruptionem, morem,
undè sæpè accersitum fuerit confluentium ge-
nus, meritò primus improbavit. Meliùs au-
tem hæc ex ipso fonte. Valeas itaque amice
Lector, & sicubi scateant Mendæ ignoscas.

S. M.

Amico suo Integerrimo M. D.

Expertissimo Domino S. M.

Solum sequaces pratulimus diu
Cum Medentes; Compar habebitur
Qui clariorem te, minori
Reddidit hoc, Medicina! Libro.

Non hic tument Mole superbiens
Blattis futurus Prada opulentior;
Sensu sed arcta ditiori
Conciliant sibi Verba Pondus.

Frustrà molesto vasta Volumine
Lustres Galeni scripta; Minutula
Acumen huic majus Tabella;
Se stupet hic Medicina totam.

Hic non remoto sordidus Angulo
Sensim fatiscet; Sedula strenue
Manus quotannis, Spe perenni
Deteret, auctior ut resurgat.

Applaudè Votis Turba Medentium:
Non Febris illum, Morbus atrocior
Haud afflet ullus; Commodis qui
Immoritur satagendo Vestris.

Sic vovet

Christophorus Crelle, M. D.

INDEX.

Hydrope	p. 65		
Hypochondriacâ affe- ctione	5	P	
Hystericâ Passione	ib.	Paralyfi	90
I		Peripneumoniâ nothâ	24
Ictero	62	Phthifi	91, 94
Iliacâ Passione	57	Pleuritide	23
L		Pruritu serino	29
Lochiorum fluxu im- modico	63	Puncturâ tendinis	85
Lochiorum suppressi- one	64	Podagrâ	100
Lue Venereâ	72	R	
M		Rachitide	79
Maniâ communi	85	Rheumatismo	25
Mensium fluxu immo- dico	58	Remediorum formu- læ	1
Mensium suppressione	83	S	
Mictu Sanguineo à Re- num calculo	49	Scorbuto	93
Morbillis	31	T	
N		Tussi	91
Nephritico Paroxyf- mo	48	Tenesmo	50
O		Tussi Puerorum con- vulsivâ	81
Ophthalmiâ	47	V	
		Variolis	34
		Ulcere Vesicæ	88
		Vomitu sanguinis	83
		Uteri procidentia	48

Medi-

Medicamentorum quædam formulæ in praxi magis familiares.

Potio Communis Purgativa.

℞ **T** Amarind. ʒss. fol Senna ʒij. Rhei ʒiss. coq. s. q. aq. ad. ʒiiij. in Colatura dissolve Manna & Syrup. Rosar. solut. an. ʒj. m. f. Potio.

Emeticum Commune.

℞ Aq. Cardui Benedict. ʒj. Infus. Croc. Metal. ʒj. Syr. Caryophyll ʒss. m. f. vomitorium. Sumat horâ 4^a Pomeridianâ, superbibendo post singulas vomitiones haustum largum liquoris possetici.

Julapium Perlatum.

℞ Aq. Cerasor. nigr. lact. Alexeter. aa. ʒiij. aq. Cinnamom. hordeat. ʒj. Margarit. preparat. ʒss. sacchar. Chrystall q. s. adde aq. Rosar. Damascen. ʒss. f. Julap. de quo cap. cochlear. iv, vel v, in Languoribus.

Julap.

Julapium Cardiacum.

℞ *Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. an. ℥iij. aq. Epidem. Syr. Caryophyll. & de succo Citri, an. ℥ss, m. f. Julap. de quo capiat sæpius.*

Decoctum Diæticum.

℞ *Rad. Sarsaparill. ℥vj. lign. Sassafr. & China ana ℥ij. Glycyrrhiz. ℥j. coq. in aq. font. Congiis ij, per horæ dimidium; deinde stent clausè super cineres calidos per horas xij. postea ebulliant ad tertiæ partis consumptionem; Cum primum ab igne amoveatur, infunde sem. Anisi. ℥ss. post duas horas coletur, & postea depuretur per residentiam, & liquor reponatur lagenis vitreis probè clausis ad usum. Sit pro potu ordinario per xxx. dies.*

Apozema Aperiens & Antiscorbuticum.

℞ *Rad. gramin. Cichor. Fanicul. & Asparag. ana ℥j. uvarum Corinthiac. & passul. enucleat. an. ℥ij. fol. hepat ling. cerv. & cap. Ven. an. M. j. fol. Beccabung. sub finem addit. M. ij. coq. s. q. aq. fontan. ad ℔j. sub finem adde vini Rhenani ℔ss. Colaturâ adhuc calente, infunde ad duas horas, vase clauso, Cochl. hortens. M. j. colatur. adde syr. è quinque radic. & è succo Aurant. ana ℥ij. aq. Cinnamom. hordeat. ℥j. M. f. Apozem. Sumat ℔ss. manè & 5^a pomeridianâ, per xiv. dies.*

Eclegma

Eclegma incrassans in Tussi.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥j. Syr. Papav. Rhœad. Portulac. Fijub. & Lohoch. sani, ana ℥ss. Sacchar. crystal. q. s. M. in mortario marmoreo ad integra hora spatium, & f. Linctus perfectè missus; recondatur in ollâ figulinâ, ad usum. Cap. sæpiùs lambend. è baculo Liquiritiæ.

Eclegma fortiùs incrassans.

℞ Conserv. Ros. rub. Syr. Violar. & de Mecon. an. ℥j. sem. papav. alb, ℥iij. contundantur simul & per setaceum trajiciantur, deindè adde ol. nuc. moschat. express. gr. vj. f. Eclegma.

In Defluxione tenui.

℞ Conserv. Ros. rub. ℥ij. Syr. de Mecon. & Fijub. an. ℥j. Oliban. Mastich. & Succin. an. ℥j. ol. nuc. Moschat. per expressionem gr. vj. M. f. Lohoch. de quo lambat sæpè; bis in die cap. Eclegm. descript. cochl. j. instiland. Balsam. Sulphur. Anifat. à gut. viij, ad gut. xij.

Cerevisia Purgativa.

℞ Polypod. Querc. ℥j. Rad. Rhabarb. Monach. fol. senna & passul. enucleat. ana ℥ss. Rhabarb. incis. & rad. Raphan. Rustican. an. ℥iij fol. Cochl. hortens. salu. an. M. iv. Aurantior. incis. N° iv, infunde in Congiis v, vel. vj. Cerevisia non lupulata, fermentationis tempore, &

¶ quando ad maturitatem perveneris, sit pro potu ordinario per dies xiv, vel xxj, præcipue verò sumat haustum singulis Auroris.

Emplastrum Hystericum.

℞ Galbani in tinctura Castor. solut. ℥ colat
℥iij. Tacamahac. ℥ij. f. Emplast. pro umbilico.

Catharticum pro Infantibus tenellis.


℞ Syrup. Cichor. cum Rhabarb. Cochl. j. par-
vulum.

Decoctum Amarum Purgativum.

℞ Decoct. amar. duplicatâ senâ ℥iv. Syrup.
de Spinâ Cervinâ ℥j. elect. de Succ. Rosar. ℥ij.
M. f. Potio.

Laudanum Liquidum Authoris.

℞ Vini Hispanici ℔j. Opii ℥ij. Croci ℥j.
pulv. Cinnamomi, & Garyophyllorum, an. ℥j.
infundantur simul in B. M. per duos vel tres
dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat
Colatura servetur pro usu.



D E

AFFECTIONE,

I N

*Fœminis, hystericâ ; maribus,
hypocondriacâ dictâ.*



U M a casu aliquo graviore
molestum patitur humana
anima, ataxiam concipiunt
animales spiritus; urina
subindè limpidissima copi-
osè excernitur; sanitatis re-
cuperandæ spes omnis pro-
tinùs abjicitur, & tristissima quævis sibi omi-
nantur ægroræ; quamcunque corporis partem
morbus infederit (plurimas autem infidet)
symptomata ei parti competentia confestim
urgent; in capite apoplexia, hemiplegiâ solu-
ta, statim à partu adoritur; spasmi epilepsiæ
per similes (vulgò uteri strangulatus, in quo
venter & præcordia guttur versùs intumescunt)
infe-

infestant; clavus hystericus, in quo dolor in capite atrocissimus, quem transverso pollice possis contegere, ægrâ interim materiam viridem bili porraceæ parem evomente, miserè excruciat; cordis palpitationem, tussim, passionem iliacam & colicam, nephritin, urinæ suppressionem æmulatur paroxysmus; vomitiones enormes, diarrhœam subindè excitat; externè in carne musculosâ nunc dolorem, nunc tumorem inducit in tibiis hydropis instar; nec (quod mireris) intactos dimittit dentes; dolor dorsi creberrimè sævit; & sæpè sæpiùs adeò refrigerantur externæ partes, ut cadaver planè referant; in risum & lacrymas effusissimas sine ullâ προφάσει ridiculè erumpunt; ptyalismus nonnunquam eo gradu laborantes afficit, ut Mercurio delibutas facilè crederes Dolores hystericæ, quamcunque partem obsident, ubi discesserint, teneritudinem, quæ tangi recusat, relinquunt, ac si verberatæ fuissent carnes.

Mittatur Sanguis ad 3viij.

Emplast. de Galbano umbilico admoveatur. Sequenti manè aggrediatur usum sequentium pilularum;

℞ *Pil. Coch. maj.* 3ij. *Castor pulv. gr.* ij. *Balsam. Peruv. gutt.* iij. *f. Pil.* xij. *Cap. iv.* singulis vel alternis matutinis, pro ratione viri-um, horâ 4^a vel 5^a matutinâ, superdormiendo.

℞ *Aq.*

℞ *Aq. Ruta* ℥iv. *Bryon. comp.* ℥ij. *Castor. nodulo ligat.* & in vitro suspens. 3ss. *Sacchar. Crystal. q. s. f. Fulap.* de quo capiat cochl. iv, vel v, in omni languore. Post has pilulas sumptas utatur sequentibus;

℞ *Limatur Chalyb. gr. viij. cum. s. q. Extract. Absinth. f. Pil. N^o ij.* Sumat summo manè, & repetantur horâ 5^a pomeridianâ per xxx dies, superbibendo haustum vini absinthitis.

Sin forma boli magis arrideat,

℞ *Conserv. Absinth. Roman. & Conserv. flaved. Aurant. an. ℥j. Angelic. condit. Nuc. Moschat. condit. & Theriach. Andromach. an. 3ss. pulv. Ari comp. 3iij. Zinzib. condit. 3ij. cum s. q. Syrup. de succ. citr. vel, ejus defectu, Syr. Aurantior. f. Electuarium.*

℞ *Elect. præscript. 3ij. limatur. Chalyb. gr. viij. cum s. q. Syrup. Aurantior f. Bolus sumendus manè & serò superbibendo haustum vini absinthitis, vel Cochl. vj. seq. Infusionis.*

℞ *Rad. Angelic. Enul. campan. & Imperator. an. 3j. fol. Absinth. vulg. Centaur. min. Marub. alb. & Chamadr. an. M. j. Cort. Aurant. duor. incis. affunde vini. Hispanic. q. s. ad supereminentiam duorum digitorum. Coletur tempore usus. Vel,*

In Delicatulis *Chalybs* exhiberi poterit in formâ pulv. sequentis;

℞ *Limatur. Chalyb. probè trit. ʒj. pulv. Ari com. ʒvj. sem. Coriand. preparat. Anisi, Fenicul. dulc. an. ʒss. Cinnamom. accutiss. Corall. rubr. preparat. an. ʒiij. Nuc. Moschat. ʒij. f. omnium pulvis subtilissimus, cui adde sacchar. albiss. ad pondus omnium, hujus cap. è Cochleari ʒss. bis in die per 4 dies tum ʒj. bis in die per 40 dies, superbidend. Cochl. vj, seq. Julap. vel vini Absinthitis.*

℞ *Aq. Lact. Alexeter. ʒxij. Gentian. comp. ʒiv. Absinth. magis comp. ʒij. sacchar. albiss. q. s. f. Julap. Vel;*

℞ *Vini Rhenan. Absinth. ʒss. aq. Gentian. comp. ʒij. Syr. Caryophyll. ʒj. f. Julap.*

℞ *Myrrh. elect. Galban. & Asæ foetida, an. ʒj. Castor. ʒss cum s. q. Balsam. Peruv. f. Pil. è singulis drachmis xij. Sumat iij, singulis noctibus, superbibend. aq. Bryon. compos. Cochl. iij, vel iv, per totum decursum hujus processûs.*

Si *Pilulæ Præscriptæ ventrem moverint, utatur sequentibus;*

℞ *Castor. ʒj. sal. succin. volatil. ʒss. cum s. q. extract. Ruta, f. pilule N° xxiv. Cap. iij. singulis*

singulis noctibus, superbibendo Julapii hysteric.
Cochl. iij, vel iv.

Sp. C. C. ad gutt. xvj, vel xvij, in aquâ aliquâ appropriatâ sæpiùs exhibitus valde confert.

Si verò his non cedat remediis, tum capiat sequentes pilulas;

℞ Trochisc. de Myrrh. pulv. ℥j. Balsam. sulphur. Terebinth. gutt. iv. cum s. q. gummi. Ammoniac. solut. f. Pil. N° iv. Cap. manè & serò superbib. Julap. hysteric. Cochl. iv, vel v, instillando Sp. C. C. gutt. xij.

Electuarium Antiscorbutic. cum aquâ ibidem descriptâ prodest in his affectionibus, ut & Electuar. corroborans cum additione Conserv. Cochl. hortens. ℥j. pulv. Ari. Compos. ℥vj. superbibendo præscriptam aquam.

At si affectus his non cedat remediis, eundem est ad aquas ferreas; & si neque his, tum ad Sulphureas, quales sunt Bathonienses.

Inter bibendum aquas ferreas hæc observanda; si aliquod Symptoma gravius acciderit, quod potationi aquarum referri potest, tunc ab iis æger abstineat, donec Symptoma istud penitus evanuerit. Æger in earum usu per sex septimanas ad minimum, vel potiùs, ad duos menses perseveret. Zinziber conditum, vel Semina Carui Saccharata, ad calefaciendum ventriculum subindè sumat. Pilula etiam hystericæ iij. devorari possunt per primas x noctes, superbibendo Julap. hysteric. cochl. iv, vel v.
Quoad

Quoad usum *aquarum Bathoniensium*, duobus diebus bibat eas, ac tertio die per modum Balnei eas ingrediatur, atque ita alternatim per sex septimanas vel duos menses.

Si *Chalybs* justo plus corpus calefaciat, tum per ejus usum quartâ quâque Aurorâ sumat *aq. mineralium purgantium* ℥iv. Quæ tametsi elyrum moveant, haud tamen tumultum cient, ut solent Cathartica ex officinis deprompta.

Si *Chalybs* magnas perturbationes inducat, Laudanum aq. aliquâ hystericâ mistum, singulis noctibus ad tempus aliquod propinandum.

Cùm à morbi diuturnitate fractæ & attritæ fuerint vires, venæsectio, & cathartica non sunt præmittenda, sed à Chalybe statim incipiendum.

Ubi Symptomata sunt mitiora, satis est sanguinem mittere, & alvum solvere ad dies *iiij.* vel *iv.* dein pilulas hystericas ad dies *x.* manè & serò exhibere.

In dolore intolerabili, vomitione, & *Diarrhœâ* enormioribus, exhibendum Laudanum, & postea corroborandi spiritus, at modò per vires liceat, antè usum Laudani, educatur è venis sanguis, & Catharticum propinetur; in viraginibus præsertim, & sanguineo temperamento præditis, in debilioribus autem, & haud ita pridem paroxysmum passis, sufficit ventriculum Congio uno lactis cerevisiati hausto, & mox per vomitum rejecto detergere, dein largam dosin *Theriac. Androm.* vel *Elect. Orvietan.*

tan. imperare, & *Cochl.* aliquot, liquoris aliqujus Spirituosi, cum pauculis Laudani liquid. guttulis, superbibenda, dare. Quòd si ægra jampridem vomuerit, & ulteriùs emeticis sollicitare periculo non vacabit, Laudanum finè morâ propinandum est, eâ dosi, quæ Symptoma vincat, & post singulas vomitiones toties quoties repetendum, in formâ potissimum solidâ, vel in liquidâ, in parco vehiculo, viz. gutt. aliquot in chochl. j. aq. Cinamom. fortior. ægrâ interim conquiescente, & caput immotum tenente.

Perdomito Symptomate, manè & serò, ad dies pauculos continuetur usus Laudani.

Hæc duo diligentur notanda, quòd cum semel post evacuationes Laudano uti coeperimus, eâ dosi, atque illâ toties repetitâ, sumendum est donec Symptoma omninò fuerit debellatum, interjecto tantùm spatiolo inter singulas doses, ut quid prior præstiterit ante noscamus quàm alteram ingeramus, deinceps cum Laudano morbum aggredimur, nihil movendum est, nihil evacuandum vel per mitissimum c-nema.

Theriaca Andromachi crebrò, diuque usurpata, magnum est in hoc, & aliis morbis quàm plurimis à coloris, & concoctionis defectu ortis, remedium.

Vina Hispanica gentianâ, angelicâ, absinth. centauro, corticum aurantior. flavedine, aliisque corroborantibus infusis medicata, si ad aliquot

quot Cochlearia ter in die potentur, admodum conferunt, modo ægra tenui non fuerit biliofoque corporis habitu.

Cortex. Peruv. ad ʒj. manè & serò, per septimanas aliquot deglutitus, præsertim in spasmodicis hysterice miras habet vires.

In tenui biliofoque corporis habitu possit usurpari Diæta lactea, præcipuè in Colicâ Hystericâ, si modò ea incommoda possint superari, quæ primis ferè diebus apportat, quod nempe tum in ventriculo coaguletur, tum etiam viribus corporis, in statu conservandis, sustentandisque minùs sufficiat.

Nihil tamen æquè sanguinem spiritusque fovet & confirmat, ac diu multumque singulis ferè diebus equo vehi; nec itinera in curru facta suo carent successu.

De Febre Depuratoriâ annorum 1661, 62, 63, 64.

Si æger juvenis sit, extrahatur sanguis è brachio, & eodem die post aliquot horas, vel sequenti die duabus horis post leve prandium, *Emeticum ex infus. Croc. Metall. paratis Zythogal. ℥vj. vel viij.* ut quoties vomuerit, aut alvum exoneraverit, è vestigio sumatur haustus, exhibeatur; & post finitam operationem Emetici, hoc vel simile paregoricum;

℞ *Aq. Cerasor. nigr. ℥iss. aq. Epidem. ℥ss. Laudan. liquid. gutt. xvi. Syr. Caryophyll. ℥ij. M. F. Haustus.*

Vomitoria ex infus. *Croc. Metall.* parata, puerulis, ullisve infra adolescentiam constitutis, vel minimâ quantitate, non est tutum exhibere.

Post hunc diem usque ad undecimum vel duodecimum singulis Auroris injiciatur enema sequens ;

℞ *Decoct. commun. pro Clystere ℔j. (vel lactis vaccini eandem quantitate) Sacchar. Culinar. ℥ Syr. violac. an. ℥ij. f. Enema.*

Post dictum diem alvus constipari permittatur, quo materia febrilis citiùs concoquatur, ad quem etiam finem Cardiacâ moderata his ultimis diebus exhibita apprimè conducunt ; ut,

℞ *Pulv. è chel. Cancror. comp. gr. xiv. Elect. de Ovo ℥ss. cum s. q. Syr. Caryophyll. f. Bolus sumendus octavâ quâque horâ, superbibendo sequentis Julapii Cochl. v, vel vj.*

℞ *Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. an. ℥iij. Aq. Epidem. ℥ Syr. Caryophyll. an. ℥j. M. F. Julap. vel alia his similia.*

Hac methodo sollicitè observatâ, usitatò circa xv. diem (tum ex laudabili in urina separatione, tum ex manifesta Symptomatum

omnium remissione) tempestivum esse Potionem Purgantem communem exhibere percipies.

Accidit interdum, maximè in Senibus, curatâ Febre, & purgato corpore, ægrum nihilominus valdè debilem esse, & quandoque tussi, interdum etiam screatu, magnam glutinosi viscosique phlegmatis copiam expectorare. Hoc in casu vinum Malaganum annosum, cum pane tosto ei immisso, bibat æger.

Si superveniat iliaca passio, præscribatur Sal. Absinth. $\mathfrak{z}j.$ ex Coch. $j.$ Suc. Limonum, manè & serò, intermediis temporibus cap. Aq. menth. stillatit. sine Saccharo, Coch. aliquot, bis quâque horâ. Dum hæc fiunt, catulus vivens nudo ventri indefinenter accumbat. Postquam dolor cum vomitu, per biduum triduumve cessaverit, exhibeatur *Pil. Coch. maj.* in *Aq. Menth.* soluta, nec removendus catulus ante pilularum usum.

Ad recidivam præcavendam, persistat in usu prædictæ aquæ per longum tempus, & duplicatis pannis laneis ventrem à frigore defendat.

De Febre Pestilentiali 1665, 66.

Post venæsectionem in lecto celebrandam, æger stragulis obruatur, & Lacinia lanea sin-
cipiti alligetur; tum, si vomitus non adfit, hoc
vel simile Hydroticum exhibe,

℞ *Theriac. Andromach.* ʒss. *Elect. de ov.* ʒj.
Pulv. è chel. cancr. comp. gr. .xij. *Coccinel. gr.*
 viij. *Croc. gr.* .iv. *cum s. q. succ. kermes, f. Bo-*
lus, quem sumat sextâ quâque horâ, superbi-
 bendo *Cochl. vj seq. Julapii.*

℞ *Aq. Card. Benedict.* & *Scord. compos. an.*
 ʒiv. *Aq. Theriacal. stillatit.* ʒij. *Syr. Caryophyl.*
 ʒj. *M. F. Julapium.*

Si adsit vomitio, hydroticum differatur, donec solo tegumentorum pondere sudor promanare incipiat, lintheamentis parte vultui superinductâ.

Incepta Diaphoresis haustulis *Zythogalæ salviâ* alteratæ, vel *Cerevisiæ*, cui macis aliquantulum incoxeris subinde repetitis ad naturalis diei spatium (i. e. horas 24.) est continuanda; in sudore licet jusculis confortativis ægrum reficere.

Ubi tumor enatus fuerit, venam aperire non sustinui; per horas adhuc à finito sudore xxiv, ægro. se in lecto continente frigus cautè devitetur. Indusium sponte suâ in corpore arefcere permittatur, potulenta omnia calidiuscule hauriantur, & *Zythogalæ salviâ* alteratæ usus etiamnum continuetur. In seq. luce potio purgat. communis exhibeatur.

Anni 1667, 1668. Febrim Variolosam & Variolas produxerunt.

Anni 1669, 70, 71, 72. Febrim Dysentericam.

Anni 1673, 74, 75. Febrim Comatosam.
Curationem febrium horum annorum non attingo; quoniam .methodo in febre anni 1685, &c. descriptâ curari eas potuisse autumo.

De Febris Intermittentibus.

Cum rigore & horrore adoritur paroxysmus, quibus mox succedit calor, & huic tandem sudor, & subsequens ἀνυπεξία: licet in primis morbi diebus, Autumno maximè, aliquoties remissio potius quàm intermissio persentiscitur. In calore æque ac in rigore vomitur ut plurimum ac vehementer, ægrotat miser cum siti & lingua arida. In tenera ætate abdominis inflatio, in adultis crurum tumor febris solutionem; tonsillarum dolor, raucedo, oculi cavi, facies Hippocratica, mortem denunciant.

℞ Cort. Peruv. subtiliss. pulv. ℥j. cum s. q. Syr. Caryophyll. vel de Rosis siccis, f. Electuarium dividendum in xij. doses; quarum unam capiat quartâ quâque horâ, superbibendo Vini cujuslibet haustum, incipiend. immediate post paroxysmum.

Siautem præscripti boli ventrem moverint, in haustu Vini dentur gutt. x. Laudan. liquid. singulis vel alternis vicibus post assumptionem boli, ut opus fuerit.

Ad recidivam præcavendam (præcipuè in quartana) repetatur processus prædictus singulis septimanis per tres alias vices.

Sin forma Pilularum magis arrideat,

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥j. cum s. q. Syrup. caryophyll. f. Pilula mediocris magnitudinis, quarum capiat vj. quartâ quâque horâ.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥ij. Vin. Rhenan. ℔ij. stent simul in infusione frigida, & coletur per manicam Hippocratis. Usûs tempore cap. ℥iij. tertiâ vel quartâ quâque horâ.

Sin ob vomituritionem, ferè continuam, Corticem deglutire nequeat æger, tum sexies, vel octies, spatio duarum horarum, Succu Limonum recens expressi Cochl. j. cum Salis Absinth. ℥j. assumat, dein Laudan. Liquid. gutt. xvj. cum Aq. cinnam. fortior Cochl. j. ac brevi post, cessante vomitu, Corticis usum aggre diatur.

In intermittentibus vernalibus, nonnunquam emeticum, tempestivè propinatum, ut nempè ante paroxysmum negotio suo defungi possit, foelicissime successit. Nonnunquam Enema in diebus intermittentibus, per triduum, vel quadriduum injectum, Curationem absolvit. Quæ sequenti quoque modo tentari potest.

℞ Serpentar. Virgin. subtiliss. pulverisat. gr. xv. Vin. alb. ℥iij. Sumat duabus horis ante

Paroxysmum, & stragulis coopertus æger sudet per *iiij*, vel *iv* horas, idem taciendo per duas alias vices ante Paroxysmum.

Si ab ingeminatis paroxysmis summè debilis fuerit æger ;

℞ *Conserv. Flor. Borag. Bugloss. an. ℥j. conserv. Anthos. ℥ss. cort. citr. condit. Nuc. Moschat. condit. Theriac. Andromach. an. ℥iiij. confectio. Alchermes ℥ij. M. F. Opiata* ; cap. ad quantitatem avellanæ, mane & vesperi, superbibendo Cochlearea paucula, alicujus *Aq. Epidemicæ simplicioris, Saccharo edulcoratæ*, interdicto interim enematum usu.

Si sub morbi excitum occurrat hydrops, nondum tamen depulsâ Febre, curatio non est instituenda remediis purgantibus, sed infusionibus rad. *Raphan. Rustican. Summitat. Absinth. centaur. Min. Baccar. Juniper. cinerum genist. &c.* in vino factis, exulante autem Febre, Catharticis, & aperientibus.

Pro infantibus Febre intermittente laborantibus :

℞ *Aq. cerasor. nigr. & Vini Rhenan. an. ℥ij. cort. Peruv. subtiliss. pulv. ℥iiij. Syr. caryophyll. ℥j. M. F. Julap. Cap. Cochl. j. alterumve*, pro ratione ætatis quartâ quâque horâ, donec Paroxysmi non amplius discrutient, instillando alternis vicibus, si Diarrhoea adfuerit, *Laud. liquid. gutt. j, vel ij.*

De Febre Stationaria, ab an. 1635, ad 90.

Calor & frigus se invicem excipiunt, artus pariter & Caput dolent, pulsus interim fere sanus, nonnunquam tussis, dolor circa collum & fauces, exacerbatio Febris prope noctem, inquietudo, sitis, lingua vel humida & ex omni parte pelliculâ albâ & scabrâ vestita, vel sicca, fusci coloris in medio, quam partem undique cingit fimbria inalbescent. A jugi in lecto decubitu coma & phrenesis, à calido regimine petechiæ, maculæ purpureæ, eruptiones (quas vocant) miliares morbillis magis rubentes, pulsus inordinatus, tendinum subsultus, atque ita tandem mors. Sudores in initio symptomatici divexant, qui, si ab arte provocentur, viscosi à Capite erumpunt, & materiam morbificam in Caput aut in artus transferunt.

Mittat. sanguis ad 3x. è brachio. Reiteretur Venæsectio, si modò respirationis difficultas, dolor Capitis inter tussendum lancinans, & alia signa Peripneumoniæ nothæ adsint. In hoc casu tam venæsectio quàm Catharsis repetenda, donec æger convalescat.

Vesperis applicetur Epispasticum, & sequenti Aurorâ Potio Lenitiva præscribatur, quæ ad tertiam vicem alternis diebus repetatur, & horâ somni post Catharsin haustus pacificus propinetur.

Rx Aq.

℞ *Aq. Paralys.* ℥iij. *Syr. de Mecon.* ℥j. *Succ. Limon. recent. extract. cochl.* ij. *M. F. Haustus.*

Aphthæ & singultus sponte suâ post curationem febris supervenientes sponte evanescent; Si in longum tempus decurrant, facilè fugantur *Cortic. Peruv.* ℥j. *cum Syr. Papav. Rhœad. q. s. in formam Electuar. vel pilular. redactâ, superbibend. haustum lactis deflorati.* Remedium hoc certissimè scopum attinget, si non frustrentur ejus vires ex jugi ægri in lecto decubitu.

Diebus à purgatione liberis sequentia præscribantur,

℞ *Conserv. Lujul. & cynosbat. an.* ℥j. *conserv. Berber.* ℥ss. *crem. Tart.* ℥j. *cum s. q. Syr. de Limonib. f. Electuarium, de quo cap. ad magnitud. Nuc. Moschat. ter in die, superbibendo sequent. Julap. Cochl. vj.*

℞ *Aq. Portulac. Lactuc. Paralys. an.* ℥iij. *Syr. de Limonib.* ℥iss. *Syr. Violar.* ℥j. *M. f. Julapium. Vel,*

℞ *Aq. font. ℔j. aq. Ros. Succ. Limonum, Sacchar. albiss an.* ℥iv. *coq. lento igne dum despumaverint, cap. ℥iij. ad libitum. Præscribatur quæque seq. gargarisma.*

℞ *Succ. Pomor. agrest. ℔ss. Syr. de rubo Ideo* ℥j. *m. f. gargarisma.* Si

Si febris ita ventriculum infestet, ut æger
 potionem retinere nequeat, *Pil. Coch. maj. ad*
℥j. exhibeantur, tum etiam hypnoticum est
 concedendum, *v. gr. Laudan. Londin. gr. iss.*
cum simili quantitate Mastich. vel Laudan. Li-
quid. gut. xviii. in aq. Cinnamom. hordeat. ℥j.

Decoctum album paratum ex ℥j. C. C.usti,
in aq. communis ℔ij. cocti, & postea Saccharo
albissimo edulcoratum sit pro potu, ut & Cere-
visia tenuis pro libitu.

Post Catharsin bis celebratam, concedatur
 ægro, Pullorum carnibus vesci, & post ulti-
 mam Purgationem, modo febris aliquantulum
 deflagraverit, vini Canarini cochl. *ijj*, vel *iv*,
 manè & sero, ut & post Prandium, per dies
 aliquot propinentur.

In Phrenitide, ut & Comate, nihil perinde
 confert, atque ægri caput radi, nullo admoto
 Emplastro, sed Pileolo tantum.

Si (quod foeminis Hystericis quandoque ac-
 cidit) post venæsectionem, & purgationes, hu-
 jusmodi iteratas, etiamnum duret, procurrat-
 que febris, modo signa Peripneumonix, & in-
 flammationis circa partes vitales absint, singu-
 lis noctibus Paregoricum, & medicamenta hy-
 sterica, bis vel ter in die, injungantur.

De Infantibus Febre Stationariâ laborantibus.

Hirudines duæ utrinque ponè aures appli-
centur, dein Emplastr. Epispasticum cervici ad-
moveatur.

Ce-

Cerevisiâ, quâ Rhabarbarum fuerit infusum, purgetur.

Si post Catharsin febris intermittere videatur, tum *Julapium cum Cortice Peruviano* (in Capite de febre intermittenti pro infantibus descriptum) exhibeatur.

De Febre Scarlatina.

Æstate exeunte, infantes præcipuè infestat. Rigent & horrent sub initium; nec tamen admodum ægrotant; cutis universa maculis parvis, rubris, crebrioribus, latioribus & magis rubentibus quàm in morbillis, interstinguitur: Ad duos tresve dies persistunt, quo quidem tempore evanescunt, & decedente subiectâ cuticulâ squammulis furfuraceis, ad instar farinæ, cutis conspergitur.

℞ *C. C. usti* ℥ *pulv. è Chel. cancr. comp. an. 3ss. Coccinel. gr. ij. Sacchar. Crystal. 3j. M. f. pulvis subtiliss. in xij Chartulas dividend. quarum unam cap. 6. quâque horâ, superbibendo cochl. ij, vel iij, sequentis Julapii.*

℞ *Aq. Cerasor. nigr. aq. Lactis Alexeter. an. 3iij. Syr. è succ. citri 3j. M. f. Julap.*

Applicetur etiam Epispasticum cervici, & qualibet nocte paregoricum ex *Syr. de Mecon.* propinetur, & postquam symptomata cessaverint, purgetur æger.

De Pleuritide.

Inter Ver & Æstatem dominatur. A rigore & horrore orditur, quos statim comitantur calor, sitis, inquietudo & cætera febrium symptomata; elapsis pauculis horis, æger vehementi dolore punctorio in laterum alterutro circa costas corripitur, qui nunc versùs omoplatas, nunc spinam, nunc anteriora pectoris sese propagat, tussì crebrâ excruciat. Materia sputo rejecta in initio morbi pauca est & tenuis, & sæpe sanguinis particulis intermixta, progressu verò copiosior & magis concocta, sanguine etiam permixto. Febris pari passu incedit cum tussì, sputo sanguinis, dolore, & pro ratione liberioris expectorationis sensim imminuitur; nunc alvus est astricta, nunc soluta nimis. Eductus è vena sanguis sevi liquati speciem præ se fert, ubi refrixerit.

Mittatur sanguis è brachio lateris affecti ad 3x.

℞ *Aq. Papav. Rhæad. ʒiv. Sal. Prunel. ʒj. Syr. Violar. ʒj. M. f. Haustus, sumendus statim à prima venæsectione.*

℞ *Amygd. dulc. excorticat. N° v, sem. Melon. Pepon. an. ʒss. sem. papav. alb. ʒiij. aq. herd. ʒiiss. aq. Rosar. ʒij. cum s. q. sacchar. cand. f. s. a. Emulsio. Cap. ʒiv. 4^a quâque horâ.*
B
℞ De-

℞ Decoct. Pectoral. ℥ij. Syr. Violar. & Cap. Ven. an. ʒss. M.f. Apozem. Cap. ℥ss. ter in die.

℞ Ol. Amygd. dulc. ʒij. Syr. Violar. & Cap. Ven. an. ʒj. Sacchar. Cand. q. s. M. f. Eclegma, de quo sæpe lambat.

Oleum Amygd. dulc. per se vel Oleum sem. Lini recentè extract. exhiberi potest.

℞ Ol. Amygd. dulc. Lilior. & unguent. Dialthæa, an. ʒj. M. f. Linimentum, quo inungatur latus affectum manè & serò, superimponendo fol. Brassicæ.

Repetatur Venæsectio ad tres alias vices, ad eandem quantitatem, quatuor diebus continuis, ubi dolor & respirandi difficultas suadent.

De Peripneumonia notha.

Ingruente hyeme & sæpe sub ejus exitum emergit, insultu primo nunc incalescit, nunc friget æger, ex motu quolibet vertiginosus est, rubent & inflammantur genæ oculique, tussit, & inter tussendum dolor capitis lancinans premit, potulenta vomitu rejicit, urina turbida est & intensè rubet, sanguis pleuriticorum æmulus anhelus crebrò & celeriter spiritum ducit dolente thorace. Ab asthmate sicco planè distinguitur, quòd in isto nusquam comparent febris indicia, in hac manifestò se produnt,

dunt, licèt minora longè & magis obscura quàm in peripneumonia vera.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad ʒx. Die sequenti æger hanc potionem sumat.

℞ *Cassia extract.* ʒj. *Glycyrr.* ʒij. *ficus pingues* N° iv. *fol. senn.* ʒiiss. *Agaric. trochiscat.* ʒj. *coq. s. q. aque ad ʒiv. in colatur. dissolv.* *Manna* ʒj. *Syr. Rosar. solut.* ʒss.

Si verò potionem assumere nequeat, *Cap. Pil. coch. maj.* ʒij. horâ quartâ matutinâ.

Sequenti die celebretur iterum venæsectio, ad eandem quantitatem; ac postero die repetatur Catharsis, quæ porrò repetenda est alternis diebus, vel post majora intervalla, pro ratione virium; Atque insuper si Symptomata non cessaverint, extrahatur iterum sanguis semel adhuc, bis, vel sæpius, diebus aliquot interjectis, prout res postulaverit; sed ut plurimum venæsectio bis celebrata sufficiet. Interim, dum hæc fiunt, præsertim in diebus à purgatione vacuis, utatur *decocto Pectorali, Eclegmate* & *oleo Amygd. dulcium*, in Pleuritide descriptis.

De Rheumatismo.

Rigorem & horrorem & cætera febrium symptomata patiuntur, elapso die uno alterove (est & ubi citius) dolor adest atrox, nunc in hoc nunc in illo artu, in carpis, humeris &

genubus præsertim, vicissim hos relinquens & illos occupans, rubore, & tumore in parte, quam postremum affecit, adhuc residuis. Febris sensim evanescit, manente dolore, quin & nonnunquam immaniùs sæviente. In lumbagine rheumatica immanis dolor adest, circa lumborum regionem fixus, nephritin mentiens, nisi quòd æger non vomituriat, qui procumbere nequit, sed vel è lecto exilit, vel super eodem erectus sedet, corpore perpetuâ agitatione nunc versùs anteriora, nunc posteriora inclinato. Sanguis pleuriticorum similis.

Mittatur Sanguis è brachio lateris affecti, ad ℥x.

℞ Aq. Nymph. Portulac. Lactuc. an. ℥iv. Syr. de Limonib. ℥iss. Syr. Violar. ℥j. M. f. Julap. de quo bibat ad libitum.

Præscribend. Emulsio 4. Sem. frigid. maj. Cataplasma è mica panis albiss. & lacte Croco tincto applicetur parti dolenti.

Die sequenti eadem sanguinis quantitas detrahatur; atque iterum, die uno vel altero interjecto, reiteretur, atque porrò quater vel pluries, si opus fuerit, hoc observando, ut post secundam Venæsectionem majora sint intervalla inter singulas sanguinis missiones.

Diebus à Phlebotomia vacuis Enema è lacte saccharato subinde injiciatur, vel sequens;

R. Decoct. commun. pro Clystere ℥j. Syr. Violar. & Sacchar. culinar. an. ℥ij. M. f. Enema.

Si Imbecillitas ægri repetitionem Phlebotomiæ non ferat, tum post secundam vel tertiam venæsectionem Curatio hac methodo tentanda.

Capiat alternis diebus *portionem purgativam communem*, donec convaluerit, & iisdem noctibus Paregoric. *ex. Syr. de Mecon.*

Sin his remediis non cedat, & æger ob imbecillitatem evacuationes qualescunque ferre nequeat, aggrediatur usum *Elect. & aq. Antiscorbutic.* in scorbuto descript. quæ etiam remedia locum habent in Rheumatismo Scorbutico.

In Juvenibus, atque iis qui temperatè vixerunt, vino non plus æquo dediti, Rheumatismus Diætâ simplici admodum refrigerante, & mediocriter nutriente, æque foeliciter, ac repetitis Venæsectionibus (quas minus ferre queant) profligari potest. *Ex. grat.*

Solo Lactis fero ad dies quatuor vescatur æger, postea præter serum pane similagineo semel in die loco prandii, donec penitus convalescat; nisi quod postremis diebus iterum panem in coenam indulgere liceat. Symptomatis cessantibus, carnes pullorum elixorum, cæteraque eupepta concedantur, tertio autem quoque die solo lactis fero victitet, donec tandem pancraticè valeat.

De Febre Erysipelatosa.

Nulla non corporis pars, præsertim facies, tumet, dolet & summè rubet, pustulæ densæ, parvæ, in vesiculas subinde facessunt, quæ per frontem caputque serpunt, oculi tumore obruti, rigor & horror atque reliqua febris indicia adsunt. In alia hujus morbi specie, liquorum attenuantium potationi superveniente, febricula adest, pustulæ urticarum puncturas referentes, nonnunquam in vesiculas sublatæ, mox recedentes, tuberculorum more sub cute se condentes, maximè pruriunt, & scalpendo rursum apparent. Est & alia eruptionis species, pectus ut plurimum obsidens, macula nimirum lata, cuti vix supereminens, porriginosa cum squammulis flavis, qua vigente, æger bene se habet, eâdem evanescente, leviter ægrotat, urina turbida & flava, iisdem remediis quibus pruritus ferinus, cedit, vino utatur æger & carnibus eupeptis.

Mittatur sanguis è brachio ad ℥ix. vel x. Die sequenti sumat *portionem communem purgativam.*

℞ Rad. Althææ & Lilior. an. ℥j. fol. Malv. Sambuc. Verbasc. flor. Chamamel. Melilot. summitat. Hyperic. & centaur minor. an M. j. sem. Lini, foenugrac. an. ℥ss. coq. s. q. aq. ad ℔ij. Coletur liquor, & tempore usûs adde singulis

gulis libris decocti Sp. Vini ℥ij. Stuphæ è panno laneo huic decocto immersæ, ac expressæ, calidè admoveantur bis in die, & pars affecta post forum sequenti mixturâ illinatur.

℞ Sp. Vini ℥ss. Theriac. Androm. ℥ij. pulv. piperis longi, & Caryophyll. an. ℥ij. f. mixtura. quâ Charta Emporetica madefacta parti affectæ circumvolvatur.

Si primæ venæsectioni non cedat morbus, tum repetatur; & nondum cessante, ad duas alias vices celebretur, interposito semper die uno.

Diebus à Venæsectione liberis *Enema è lacte cum Syr. Violarum, Emulsio refrigerans & Julap. refrigerans, sunt præscribenda.*

De pruritu ferino, & inveteratis cutis eruptionibus, quæ Venæsectioni & Catharsi non cedunt.

℞ Theriac Andromach. 3ss. Elect. de ovo Dj. rad. Serpentar. Virgin subtiliss. pulver. gr. xv. Lapid. Bezoar. oriental gr. v. cum s. q. Syr. è conditur. citri f. Bolus, horâ somni sumendus per dies xxj. superbibendo cochl. vj. sequent. Julapii.

℞ Aq. Card. Benedict. 3vj. aq. Epidem. & Theriacal. stillat. an 3ij. Syrup. Caryophyll. 3j. M. f. Julap.

Singulis mantutinis cap. liquoris possetiei
℥ss. calidè, & sudet horæ unius spatio.

His finitis, si pustulæ adhuc non evanue-
rint, sequenti Linimento partes affectæ inun-
gantur.

℞ Unguent. ex Oxylapatho ℥ij. Unguent. Po-
mati ℥j. flor. Sulphur. ℥iij. ol. Rhodii ℥ss. f.
Linimentum.

Veruntamen Medicamenta præscripta haud
usurpentur, nisi Venæsectione & Catharsi ritè
præmissis.

De Angina.

Angina inter Ver & Æstatem ut plurimum
aggreditur. Sequuntur febris insultum dolor
& faucium inflammatio, unde à tumore uvu-
læ, tonsillarum & laryngis, nec deglutire que-
at æger, nec spiritum ducere.

Mittatur Sanguis è Brachio copiosè. Tan-
gantur partes inflammatae melle Rosaceo, Sp.
Vitrioli, vel Sp. Sulphuris ad summum acorem
permixto, vel Sp. Vitrioli solo. Mox Gargarisma
sequens usurpetur, non vulgari modo; sed ita
ut sine ulla agitatione in ore contineatur, do-
nec incalescat; dein expuatur, & repetatur
subindè.

℞ Aq. Plantag. Ros. Rubr. & Sperm. Ra-
nar. an. ℥iv. album. ovor. in aquam agitando
redact.

redact. N° iij. *Sacchar. Crystal.* ʒiij. *M. f.*
Gargarisma.

Emulsio Refrigerans in Pleuritide descripta
indies fumatur.

Sequenti manè, nisi febris & dolor inter de-
glutiendum remiserint, Venæsectio repetatur,
Catharsi in diem posterum rejectâ, aliàs Ca-
tharticum lenitivum exhibeatur.

Manente adhuc affectu (quod oppidò ra-
rum) repetatur adhuc Venæsectio, & Cathar-
sis; Epispasticum amplum ac forte applicetur
cervici post primam Venæsectionem. Omni
manè, nisi diebus purgationi datis Enema re-
frigerans & Emolliens injiciatur; Diætâ tenui
utatur æger, & lecto per horas aliquot quoti-
die absistat.

In his omnibus Febribus, quas intercurren-
tes appello, ut etiam in illa, quæ stationaria
est, cautè observandum, quòd æger à lecto ab-
stineat magnam diei partem, ut jusculis hor-
deaceis, avenaceis, ac id genus aliis victitet,
& cerevisiam tenuem lupulatam & hydroga-
lam pro potu ordinario bibat.

De Morbillis.

Infantes plerumque impetunt. Primo die
rigent horrentque, calent & frigent alterna-
tim. Secundo consummatam febrim accer-
sunt. Aegritudo vehemens, sitis, inappeten-
tia, lingua alba (non verò sicca) tussicula, ca-

pititis & oculorum gravedo, & somnolentia perpetua, acriter premunt, humor è naribus & oculis jugiter stillat (quæ lachrymæ certissimum morbillorum signum.) Huc accedunt sternutatio, tumor palpebrarum paulò ante eruptionem, vomitus, diarrhœa, cum dejectionibus colore viridi in dentientibus præsertim. Symptomata ingravescent ad quartum usque diem, quo quidem die (nonnunquam quinto) in fronte & facie maculæ parvæ, rubræ, pulicum morsibus persimiles prodeunt, quæ numero & magnitudine auctæ racematim coalescunt, & faciem maculis rubris majusculis interstinguunt: Hæ maculæ è parvulis papulis, supra cutim paululum elevatis conflantur, quarum protuberantia digito levi, vix oculorum acie deprehendi possit.

A facie, quam primò solùm occupant, ad pectus ventremque, crura deinde tibiaeque propagantur maculæ; in his autem partibus latæ & rubræ, superficiem cutis non superantes conspiciuntur. Eruptione morbillorum non perinde deliniuntur Symptomata ac in variolis. Vomitus post eruptionem nullus; sed tussicula & febris cum spirandi difficultate intenduntur, in oculos defluxio, somnolentia & inappetentia perseverant. Die sexto aut circiter frons & facies asperescunt, emorientibus pustulis, ruptâque cuticulâ, in reliquo corpore maculæ latissimæ sunt, & maximè rubescunt. Octavo circiter die in facie evanescent, & vix in reliquo

quo corpore permanent. Nono nullæ prorsus sunt; per faciem verò & artus quandoque & totum corpus in farinam quandam & squammulas faceffunt, & tunc temporis febris, spirandi difficultas & tussicula augentur. In adultis à calido regimine livescunt primò, mox nigrescunt exanthemata.

℞ *Decoct. Pectoral. ℥iſs. Syrup. Violar. & Cap. Ven. an. ℥iſs. M. f. Apozema; Cap. ℥iij. vel iv. ter vel quater in die.*

℞ *Ol. Amygd. dulc. ℥ij. Syr. Violar. & Cap. ven. an. ℥j. Sacchar. Cand. albiss. q. s. M. f. Eclegma, de quo sæpius lambat, præcipuè quando tussis urget.*

℞ *Aq. Cerasor. nigr. ℥iij. Syr. de Mecon. ℥j. M. f. haustus singulis noctibus sumendus, à primo morbi insultu, usque dum convaluerit æger dosin augendo vel imminuendo pro ratione ætatis.*

Æger se contineat in lecto per biduum post primam eruptionem.

Si post Morbillorum discessum, Febris, respirandi difficultas, & alia Symptomata Peripneumoniam mentientia supervenerint, sanguis liberaliter extrahendus è brachio, semel, bis, vel ter, prout opus fuerit, convenienti spatio interposito inter singulas Venæsectiones; Atque etiam continuentur *decoctum Pectorale supra descriptum,*

scriptum, ut & *Loboch.* vel *Ol. Amygd. dulo.* *per se.* Circa diem *xij.* ab invasione Cathartico lenienti purgetur.

Diarrhœa, quæ morbillos excipit, Venæsectione sanatur.

De Variolis.

Distinctæ sunt, vel confluentes: & in distinctis invadunt rigor & horror, calor intensus, capitis & dorsi dolor vehemens, vomituritio, in adultis ingent in sudores propensio (& hinc minime confluxuras esse licet conjicere) dolor sub scrobiculo cordis si manu prematur, stupor & somnolentia, nonnunquam & insultus epileptici (in infantibus præsertim) quibus si dentitione peractâ corripiantur, in procinctu esse variolas possis prædicere, ita ut si fortè insultum epilepticum sub vesperam patiantur, sequenti Aurorâ in conspectum se daturæ sunt variolæ, mites ut plurimum & rarissimè confluentes. Quarto inclusivè ab invasione die; nonnunquam feriùs, rarò tamen ante illum erumpunt, quo tempore vel minuuntur Symptomata vel prorsus evanescunt. In eruptione autem subrubræ primò pustulæ, tenuissimarum acicularum puncta æquantes, sparsim se produnt per faciem, collum, pectus, & corpus universum; tunc in faucibus dolor, qui cum pustulis surgentibus augetur. Circiter octavum à primo insultu diem intervalla pustularum priùs

priùs alba rubere jam incipiunt, in tumorem attolli, & dolore tensivo affici; extenduntur palpebræ, & ut vesica inflata, oculos claudunt. Proximæ à facie intumescunt manus, digitique distenduntur; pustulæ faciei antea læves & rubræ, jam asperæ (primum maturationis indicium) & subalbidæ apparent, succum insuper luteum, colore à favo non abludentem evomunt, faciei & manuum inflammatio jam summa in pustularum interstitiis colorem exhibet floridum, & rosarum Damascenarum æmulum, quem quidem colorem, quo mitiores sunt variolæ, eo magis tum pustulæ tum cutis interjecta ad amussim exprimunt: Quæ faciem occupant pustulæ, asperiores quotidie ac magis flavæ pro maturationis ratione; quæ manus & reliquum corpus, minùs asperæ albæque magis conspiciuntur indies. Die undecimo faciei tumor & inflammatio recedunt, pustulæ maturæ & justam magnitudinem (viz. pisi grandiusculi) adeptæ exarescunt deciduntque. Decimo quarto vel quinto pereunt funditus; manuum autem pustulæ pertinaciores, albæ adhuc & recentes die uno aut altero moras trahunt & tandem dirumpuntur; cæteræ autem, faciei nimirum & corporis desquamantur, & in facie squammulis hisce furfuraceis succedunt foveæ. Per totum morbi decursum alvus vel prorsus constipatur vel rarissimè dejicit. Maxima eorum pars, qui ex hoc morbo pereunt, octavo die in discretis, undecimo

cimo autem in confluentibus intereunt: Quippe cum in discreto hoc genere promoventur sudores tum cardiacis tum regimine calidiore, prædicto die facies, quæ turgida, & per interstitia pustulis interjecta inflammari debuerat, è contra flaccida reperitur & albescent, pustulis nihilo minus rubentibus & elevatis, etiam post ægri mortem; sudor, qui hucusque manaverat, derepentè evanescit, æger interim phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine vehementibus, urinam parcè reddit ac frequenter, & tandem paucissimarum horarum spatio ad plures migrat.

In Confluentibus eadem Symptomata (sed atrociora) febris scilicet, anxietas, ægritudo, vomituritio, &c. immanius sæviunt; licet non ita promptè, ac in discretis, in sudores dissolvitur æger. Diarrhoea nonnunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum aut alterum post illam protrahitur, quod in discretis vix contingit. Tertio die aut citiùs, rarò tardiùs, erumpunt; & quo citiùs, eo magis confluunt. Quandoque ad quartum vel quintum diem differtur eruptio ob atrox aliquod symptoma, v. g. acutissimum dolorem in lumbis, nephritici æmulum, in latere pleuritici, in artubus rheumatici, in ventriculo cum ingenti ægritudine & vomitu. Non perinde, ac in discretis, mox ab eruptione remittunt symptomata, sed & febris & alia ad multos etiam dies post eruptionem pustularum ægrum discruciant; Nunc
ery-

erysipelatis ritu, nunc morbillorum erumpunt, eruptionis licet tempore planè distinguantur. Crescente morbo, non in molem aliquam spectabilem attolluntur; sed in facie sibi invicem implicitæ, tanquam vesicula rubra, vultum omnem contegunt, quem maturius elevant quàm discretæ: postmodum ad instar pelliculæ albæ vultui agglutinatæ cutis superficiam non admodum superant. Præterlapso die octavo, pellicula alba quotidie paulatim magis exasperatur, colore fusco: Intensus magis est dolor cutis, donec tandem in truculentiori morbo non nisi post diem vicesimum lationibus laminis desquamatur. Hoc interim observatu dignum, quòd quanto pustulæ maturescentes propiùs ad colorem subfuscum vergunt, eò deteriores lentiùs abscedunt; quo magis autem flavescent, eò minus confluxerint, & ociùs se proripiunt. Ubi primùm deciderit pellicula, nullâ scabritie vultus afficitur; at verò mox illam excipiunt squammulæ furfuraceæ, indolis perquam corrolivæ, quæ foveas relinquunt patientiores, & sæpe cicatrices. Quandoque humeri & dorsum cuticulâ denudantur. Morbi periculum à pustularum frequentia & numero in facie solâ, æstimandum. Pustulæ manuum & pedum majores, & quo altiùs ab extremitate artuum ascenderis, eo sensim minores & contractiores extant. In adultis salivatio, in infantibus diarrhœa (licèt non ita certò) confluentium comes. Ptyalismus nunc cum eruptione

ptione se prodit, nunc biduo triduove præterito, materiam primò tenuem, die undecimo viscidiorē ægerrimè excreat. Siticulosus est æger, voce raucâ, somnolentiâ & stupore ingentibus corripitur, inter bibendum subinde tussit, & potus per nares revertitur. Tunc cessat ut plurimum salivatio, cui nisi faciei intumescencia (quæ licet hoc ipso die pro morbi genio aliquantisper remitti debeat, non tamen nisi post diem unum alterumve omnino recedere) & manuum jam insigniter incipiens & diutiùs perdurans suppetias tulerint, ægro protinus moriendum est. Diarrhœa non ita maturè infantes occupat ac ptyalismus adultos. In utraque variolarum specie febris ab insultu ad eruptionem dominatur, inde dat inducias ad pustularum maturationem, quâ peractâ, desinit. Superveniunt à malo regimine symptomata anomala; qualia sunt, postularum flacciditas & subsidentia, phrenitis, coma, maculæ purpureæ pustulis interspersæ, & in earum summitate maculæ nigræ exiguæ in medio subsidentes, sanguinis mictus & sputum sub initio morbi, urinæ suppressio.

Separationis tempus cum febrili ebullitione tribus vel quatuor primis diebus transigitur: Expulsio per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis abscessibus, in carne perficitur.

Dies in quo maximè periclitatur æger, in confluentibus in minimè crudo & maximè vulgari genere, à primo morbi insultu, est undecimus,

decimus, in crudiore adhuc decimus quartus, & in crudissimo decimus septimus; nonnunquam tamen sed rarius, non ante diem vicesimum primum moritur æger. Quinimo per spatium illud omne, quod inter dies undecimum, & decimum septimum interjacet, appetente vespérâ, molestissimo inquietudinis paroxysmo, quotidie vexatur æger.

Mittatur sanguis quovis ex tribus primis diebus ab invasione ad $\mathfrak{z}ix.$ vel $x.$ & postea *Vomitorium* exhibeatur ad $\mathfrak{z}j.$ vel $\mathfrak{z}iss.$ *Infusionis Croci Metallorum.*

His primis diebus diluatur sanguis frequenti potatione Cerevisiæ tenuis lupulatae. Cui Vitrioli Spiritus immisceatur usque ad plenam pustularum eruptionem.

Cum variolæ omnes eruperint (quod ut plurimum est sexto die post invasionem) vespere propinetur *Syr. de Mecon.* $\mathfrak{z}j.$ quæ repetatur dehinc singulis noctibus ad diem decimum post invasionem. Eâ nocte, si Variolæ è Confluentium genere fuerint, augeatur dosis ad $\mathfrak{z}iss.$ quæ dein repetatur ad $\mathfrak{z}j.$ manè, & ad $\mathfrak{z}iss.$ serò singulis noctibus, donec æger convaluerit.

Si *Syr. de Mecon.* minus congruat, substitui possit *Laudan. Liquid.* viz. gutt. $xviii.$ pro $\mathfrak{z}j.$ *Syrupi,* & gutt. $xxv.$ pro $\mathfrak{z}iss.$ Hoc interim observandum, quod si paregoricum bis in die exhibitum orgasmum compescere non valeat (quod in variolis insigniter confluentibus sub
finem

finem earum sæpe accidit) tum 8^a quaque hora exhibendum, vel sæpius, si opus fuerit.

At si variolæ interstinctæ fuerint, satis erit, ut solummodo singulis noctibus post plenam eruptionem exhibeatur Paregoricum, atque etiam in minori dosi.

Qualiscunque autem generis variolæ fuerint, atque etiam qualicunque morbi tempore, si Phrenitis acciderit, omnino oportet ut inordinato spirituum motui frænum injiciatur, ac proinde si prior Paregorici dosi metam non attingat, alia atque alia assumatur, donec tumultus penitus compescatur, interposito inter singulas doses spatio aliquo; ut pernoscere valeamus, utrùm dosi ultima id, quod quærimus, præstiterit, antequam nova ingeratur.

Si omnimoda urinæ suppressio acciderit, æger e lecto eximatur, & aliquantulum obambulet.

Si saliva ob calorem sit adeò viscida, ut expectorari non possit, tum Gargarisma cum syringa sæpe in fauces injiciatur. Componatur à *Cerevisia tenui* vel *aq. hord. cum. Melle Rosarum*; vel sequens usurpari poterit.

R. Cort. Ulmi ʒvj. rad. Glycyrrhiz. ʒss. Passul. enucleat. N° xx. ros. rub. p. ij. coq. s. q. aq. ad. ʒijss. in Colatur. dissolv. oxymel. simp. & mell. Rosar. an. ʒij. M. f. Gargarisma.

Si epispastico opus fuerit, amplum satis & acre nuchæ applicetur nocte istâ, quæ magnam morbi crisin præcedit, mox ab assumpto paregorico;

gorico; plantis quoque pedum applicari potest allium, à die octavo, usque ad morbi finem, singulis diebus renovandum.

Si Infans de Symptomatis, dentitionem comitantibus, jam securus, derepente spasmo corripitur, hic cogitandum est convulsionem istam, fortassis à naturæ conatu, quæ variolas, scarlatinam Febrem, aut morbillos, in corporis habitum protrudere satagit, pendere; applicetur itaque Emplast. Epispasticum nuchæ, lecto quamprimum committatur æger, exhibeatur insuper cardiacum, cui paregorici pauxillum est admiscendum, puero nempe trienni *Laud. Liquid. gutt. v. in aq. Epidem. cochl. j.*

Si die undecimo, vel alio quovis post eum, febris secundaria cum inquietudine, jactatione, & cæteris id genus symptomatis, usque adeò efferatur, ut Paregoricis utcunque repetitis sufflaminari nequeat, & mors quasi immineat, tum sanguis ad satis magnam quantitatem illi- cò detrahatur, nempe ad $\text{℥}xij.$ vel circiter, atque porrò repeti possit semel vel bis in sequentibus diebus, si symptomatum dictorum ratio idem postulârit; at non aliàs. Catharsis etiam blanda die decimo tertio (non antea) vel quovis alio die eum insequente (modo Venæsectio præcesserit) institui possit, nempe ex *Electuarii Lenitiv. ℥j. dissolut. in aq. Cichor.* vel *lactis Alexeter. ℥iv.* Veruntamen nec Venæsectio nec Catharsis impediunt, quo minùs Paregorica in usum veniant, quæ (haud ob-
stantibus

stantibus iis) tam quoad largam dosin quàm repetitam exhiberi debent, si opus adhuc fuerit: nam adhuc in hoc morbo semper confugiendum.

Quando Pustulæ perfectè exaruerint, inungatur facies Linimento ex æqualib. partib. *ol. Amygd. dulc. & Pomat.* per biduum; at non ultra.

Die *xxj.* post invasionem mittatur sanguis è brachio; & sequenti die Catharsis celebranda, quæ porro alternis diebus ad tres alias vices repetatur.

Quoad Regimen; è lecto abstineat ad sextum diem post invasionem, in quo postea se contineat usque ad *xvij.* non aliis stragulis tectus, quàm quibus sanus uti solebat.

Jusculis avenac. hordeac. Pomis coct. & Cerevisiâ tenui victitet, & post undecimum diem vini Hispanic. Cochl. *iv.* vel *v.* bis in die exhibeantur, si æger voluerit.

Si crurum tumor non evacuationibus præscript. cedat, tum fotu fol. Malv. verbasco. Sambuc. Lauri, cum floribus Chamæmel. & Melilot. in lacte coct. facilè fugatur.

Si primis morbi diebus æger Hæmoptoë laboret, vel urinam reddat sanguineam, tum pulvis & tinctura, quæ in capite de Hæmoptoë præscribuntur, sextâ quâque horâ (donec symptomata ista prorsus cessaverint) diligenter exhibeantur. Quo etiam casu Paregorica liberali manu propinanda.

De chorea Sancti Viti.

Convulsionis species quædam est, pueros puellæve à decimo ætatis anno ad pubertatem invadit, prodit se claudicatione, vel instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit factorum more; manum ejusdem lateris, vel pectori vel alii alicui parti applicitam, nequit continere in eodem situ horæ momento, sed in alium situm & locum convulsione distorquebitur, quicquid æger contra nitatur. Antequam poculum ad os possit adducere, mille gesticulationes, circulatorum instar, exhibebit: Non enim rectâ lineâ ori admovet, sed deductâ à spasmo manu, huc illuc aliquandiu versat, donec tandem fortè fortunâ labris propius apponens liquorem derepentè in os injicit, & avidè haurit; deditâ tanquam operâ, ut spectantibus risum moveret.

Sanguis ad ℥viij. plus minus, pro ætate, ex brachio educatur.

Die sequenti, dimidia pars, vel quiddam amplius, pro ratione ætatis, potionis commun. hauriatur; & vesperi haustulus sequens propinetur.

℞ Aq. Cerasor. nigr. ℥j. aq. Epilept. Langii ℥iij. Theriac. Andromach. ℥j. Laudan. Liquid. gutt. viij. f. haustus.

Potio

Potio Cathartic. ad tres vices, alternis diebus repetatur; & *haustus Paregoricus* iisdem noctibus.

Postea Sanguis iterum extrahatur; & ad Catharsin, uti prius, æger revertatur, & sic sanguis mittatur, & alvus subducatur ad tertiam quartamve vicem; spacio tamen inter alternas evacuationes observato, ut nihil periculi ægro immineat.

Diebus à purgatione vacuis sequentia præscribantur.

℞ *Conserv. Absinth. Roman. & flaved. Aurantior. an. ʒj. Conserv. Anthos. ʒss. Theriac. Andromach. vet. & nuc. moschat. condit. an. ʒiij. Zinzib. condit. ʒj. Syr. è succ. citr. q. s. f. f. Electuar. de quo capiat ad magnitud. nuc. moschat. manè & horâ quintâ pomeridianâ, superbibend. vini sequentis Cochlear. v.*

℞ *Rad. Pœonia, Enul. Campan. Imperator. & Angelic. an. ʒj. fol. Rut. Salv. Betonic. Chamadr. Marrub. alb. & summitat. Centaur. min. an. Mj. Baccar. Juniper. ʒvj. Cortic. duor. Aurantior. Incidantur & infundantur frigide in vini Canarini ℥vj. Coletur tantummodo usûs tempore.*

℞ *Aq. Rut. ʒiv. aq. Epilept. Lang. & Bryon. compt. an. ʒj. Syr. Pœon. ʒvj. M. f. Fulap. cap.*

cap. Cochl. iv. singulis noctibus cubitum iturus, instillando *Sp. C. C. gutt. viij.*

Applicetur plantis pedum Emplast. è Carranna.

Ob Recidivæ metum pertundatur ei vena, & ad dies aliquot purgetur, eâ ipsâ anni sequentis tempestate (vel paulo ante) quâ morbus invasit.

Verisimile mihi videtur, quòd hæc methodus curationi Epilepsiæ Adultorum convenire possit, quod tamen non adhuc expertus sum. Cum verò Chorea *Viti* ætates teneras adoriri soleat, in Epilepsia Adultorum tam sanguinis detrahendi quantitas, quàm Catharticorum dosis adaugeantur.

De Apoplexia.

Somnus est profundissimus, & omnimoda sensûs & motûs privatio, exceptâ respiratione, quam ægri habent difficilem cum stertore.

Mittatur Sanguis è brachio ad $\text{℥}xij.$ quamprimum, ac postea ex venis juglaribus ad $\text{℥}viij.$ deinde *Vomitorium* ex $\text{℥}iss.$ vel $\text{℥}ij.$ *Infus. Croc. Metal.* propinetur statim.

Emplastr. Epispastic. satis amplum ac forte cervici applicetur.

Dum hæc aguntur, erectus sedeat æger in lecto, nec stragulis nimis obrutus.

Sp. Sal. Armoniac. optimè rectificatus admoveatur naribus.

Finitâ

Finitâ Vomitorii Operatione, subinde exhibeantur Coch. iij. vel iv. sequentis Julapii.

℞ *Aq. Ruta* ℥iv. *aq. Bryon compos.* & *Antiepilept. Lang. an.* ℥j. *Sp. C. C. gut.* xx. *Sacchar. Crystal. q. s. f. Julap.*

Vel *Cochleare* j. *Sp. Lavendula compos.* per se propinari possit bis vel ter, durante paroxysmo, horâ dimidiâ vel integrâ interpositâ.

Cavendum est, ne Cardiacâ plus justo calida, ac nimis frequenter (uti mos est) exhibeantur; nam quacunque demum specificâ virtute pollere videantur, plus damni quam emolumenti ægro apportant, utpote quæ humores fundere (ac proinde malum augere) apta nata sunt: quod etiam incommodum non minus infertur ex nimia stragulorum congestione.

Paroxysmo jam finito, ad præcavendam recidivam sequentia exhibeantur.

℞ *Pil. Coch. maj.* ℥ij. cap. tertiâ quâque die per 6 vices horâ 4^a matutinâ, superdormiendo.

℞ *Conserv. flor. salv. Roris marin. an.* ℥j. *Conserv. flaved Aurant.* ℥vj. *nuc. moschat, condit.* & *Zinzib. condit. an.* ℥ss. *Theriac. Androm. vet.* ℥ij. *pulv. elect. diamb. diamosch. dulc. an.* ℥j. *cum. s. q. Syr. conditur. citr. f. opiata,* capiat ad magnitudinem Castanæ manè & serò, superbibend. *aq. Epilept. Lang. Coch. ij.*

℞ *Ambr.*

℞ *Ambr. gris. 3ss. ol. destil. sem. Anisi, cin-*
namom. nuc. moschat. an. gutt. ij. ol. Caryophyl.
gut. j. Sacchar. in aq. flor. aurantior. solut. 3iv.
f. s. a. Tabella, quarum capiat unam ad libi-
tum.

Ab usu potûs generosioris cujusvis sibi tem-
 peret, vescatur jusculis avenaceis, hordeaceis,
 ut & ex pullis gallinaceis confectis, & quan-
 doque etiam (præcipuè inter purgandum) car-
 ne pullorum, agnorum ac id genus ciborum
 eupepton.

De Ophthalmia.

Ex oculorum inflammatione patet.

Mittatur Sanguis è brachio ad 3x. Sequen-
 ti die sumat potionem purgativam commu-
 nem, quæ repetenda est per duas alias vices, du-
 obus diebus interpositis; iisdem noctibus su-
 mat *haustum paregoricum ex Syr. de Mecon. 3j.*

Diebus a purgatione vacuis sumat ter aut
 quater in die 3iv. *Emulsionis ex sem. frigid.*
maj. & Papav. alb.

℞ *Aq. Plantag. Ros. rub. & Spermat. Ra-*
nar. an. 3j. pulv. Tutia preparat. 3j. f. Col-
lyrium, cujus guttæ aliquot instillentur oculis
bis in die; at non incipiendum, nisi post pri-
mam purgationem.

Si his remediis affectus haud cedat, repeta-
 tur Venæsectio semel vel bis (præcipuè si san-

guis Pleuriticus apparuerit) ut etiam Catharsis.

Abstineat ab usu vini & cujusvis liquoris generosi, ab usu etiam ciborum coctum difficili-
um, & sale conditorum & diebus inter pur-
gationes bibat hydrogalam coctam.

Nota, quod sæpè accidit, quòd Venæsecti-
oni & Catharsi utcunque repetitis Ophthalmia
non cedit; hoc in casu *Paregoric. ex Syr. de*
Mecon. ℥j. singulis noctibus exhibitum, curati-
onem sine aliorum suppetiis absolvit.

De Uteri Procidentia.

℞ *Cort. Querc.* ℥ij. *Coq. in Aq. font,* ℥iv.
ad ℥ij. sub finem addendo Cortic. Granator.
contus. ℥j. *ros. rub. flor. Granator. an.* Mij. *de-*
in adde vini rubr. ℥ss. Colatura sit pro fotu,
qui cum pannis laneis parti affectæ admovea-
tur manè horis duabus, antequam è lecto as-
surgat, & nocte post decubitum, donec symp-
toma penitus evanuerit.

De Paroxysmo Nephritico.

Adsunt dolor fixus in lumborum regione,
urina cruenta, arenularum aut calculi excretio,
stupor cruris è directo renis laborantis, testis
retractio ejus lateris, in quo est dolor, nausea
& vomitus. Dolor colicus nephritico haud
absimilis; licèt in quibusdam symptomatis
planè

planè discrepet, quæ resensita in *Capite de Cælica biliosa* videas.

Si æger temperamento sanguineo fuerit, mittatur sanguis è brachio affecto reni respondent ad 3x. dein liquoris posseticæ cui Rad. *Althææ* 3ij. incocta fuerint Cong. j. quam citissimè deglutiatur; & Enema sequens injiciatur.

℞ Rad. *Althææ* & *Lilior.* an. 3j. fol. *Malv. Parietar. Branc. Ursin.* & flor. *Chamamel.* an. M. j. Sem. *Lini* & *Fœnugr.* an. 3ss. coq. s. q. aq. ad 1biss. M. F. Enema. Rejctis Vomitorio & Enemate, *Laudani Liquid*i satis magna dosi propinetur, viz. ad gutt. xxv. vel Pill. *Matth.* gr. xv. vel xvi. In senibus verò, & morbo diuturno fractis, ut & vetulis Vaporibus obnoxiiis (præcipuè si sub initium Paroxysmi urinam eæ reddant nigram & sabulosam) Venæsectio omittatur; at quoad reliqua, eadem quæ dicta est viâ omnino procedendum.

In mictu Sanguineo a calculo renibus impacto.

Capiat æger, statò quodam die, singulis hebdomadis, *Mannæ* 3iiss. in feri lactis 1bij solut.

Conducit aliquando, haustus cerevisiæ tenuis liberalior.

In calculo renum grandiori, dolor hebes, & obtusus, nullatenus auctus, sed satis tolerabilis persentitur, nec paroxysmus nephriticus comitatur.

Aquis chalybeatis æger se non tutò committet, nisi prius certò sciat, calculum majorem non esse, quam ut per ureteres viam possit invenire, quod, hoc tantum modo, certò potest dignosci, si nempe, jam antea, paroxysmum aliquem nephriticum fuerit perpessus, (cum dolore scilicet sævissimo in renum alterutro, per ureterum ductus propagato, & vomitu enormi) pro comperto habeat, non tam grandiore aliquem calculum pelvi concludi, quam lapillorum exiguorum congeriem, quorum unus subindè in ureterem illabitur, atque ita paroxysmum invitat, qui fere non desinit, nisi calculo in vesicam detruso; cum sic se res habeat, nullum est magis efficax remedium, quam aquarum chalybeatarum potatio: quod si calculosus, nullo unquam paroxysmo nephritico fuerit tentatus, cum jam major sit calculus, quam qui ex pelvi possit elabi, devitandæ sunt aquæ ferreæ.

De Dysenteria, Diarrhœa & Tenesmo.

Rigent horrentque, sequitur deinde totius corporis calor, quem brevi excipiunt ventris tormina, & hæc, dejectiones crebræ, mucosæ omnes (nisi quòd stercorosæ nonnunquam interponantur) cum ingenti cruciatu & molestissimo viscerum omnium quasi descensu, quo-ries exoneratur alvus, sanguinis interim lineamentis intertextæ, licèt aliquando ne minimum

mum sanguinis per totum morbi decursum admisceatur. Progressu morbi sanguis sincerus quandoque excernitur, & gangrænâ insaniabili afficiuntur intestina. Si æger ætate floreat, vel cardiacis incalescat, febricitat admodum, lingua est subalbida, quadam mucilage dense obsita, interdum nigra & sicca. Prosternuntur vires, dissipantur spiritus, aphthæ insuper oris interna faucesque obsident, præsertim ubi materiæ peccantis evacuatio adstringentibus præpostere impeditur, non exacto per cathartica morbi fomite. Aliquando, exulante febre, agmen ducunt tormina, & cætera morbi symptomata sequuntur.

In diarrhœa humores excrementitii sine sanguine aut intestinorum exulceratione excernuntur.

In tenesmo assidua est desidendi cupiditas, nihil tamen præter mucosum quoddam & subcruentum aut purulentum rejicitur.

Mittatur sanguis è brachio quamprimum, eademque nocte *Paregoricum* propinetur; & mane sequenti *Portio purgans communis*, repetenda alternis diebus ad duas alias vices, & *Paregoric.* post Purgationes, quam primum suo defunctæ sunt munere; ac diebus à purgatione vacuis idem manè & serò est exhibendum.

Post Venæsectionem & Catharsin semel celebratam, per totum morbi decursum, sequens Cardiacum exhibeatur.

℞ *Aq. Ceras. nigr. & Fragor. an. ℥iij. Aq. Epidem. Scord. comp. & Cinam. hordeat. an. ℥i. Margarit. preparat. ℥ss. Sacchar. crystal. q. s. adde Aq. Rosar. Damascen. ℥ss. ad gratum saporem, m. f. Fulap. de quo cap. cochl. iv. vel v. in languoribus, vel ad libitum.*

Potus sit Lac coctum cum *Aq. Triplo*, vel *Decoct. Alb.* ut,

℞ *C. C. C. & mic. panis alb. an. ℥ij. coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. postea s. q. Sacchar. Albiss. edulcoretur. Vel si dejectio virium postulaverit, Aq. font. ℥ij. cum. Vin. Canarin. ℥ss. simul cocta, pro potu frigide assumantur.*

Cum per tres vices purgatus fuerit æger, tota curatio usui *Laudani* bis vel ter in die repetiti postea incumbit, nisi quod *Enema ex Lac. vaccin. ℥ss. & Theriac. Androm. ℥ss.* subinde injiciatur, quod in alvi egestionibus mire confert.

Cum alvi fluxus in *Diarrhoeam* tantum assurgat, *Phlebotom. & Catharsi præscript. omissis*, seq. *Bolus* singulis matutinis exhibeatur.

℞ *Rhabarb. pulv. ℥ss. (plus minus pro ratione virium) cum s. q. Diascordii f. Bolus, addendo Ol. Chym. cinnam. gutt. ij.*

Noctibus insequentibus *Paregoric. ex Aq. cinnam. hordeat. ℥j. & Laudan. Liquid. gutt. xiv. exhibeatur.*

Ubi tormina sicca sine dejectionibus excruciant, curantur diluendo sero lactis frigide
pro-

propinato, & tepidè injecto; ut in Cholera morbo, pullorum jusclo aut lacte cerevisiato.

Si hic morbus diutius excurrat, adeò ut omnis ejus vis in rectum intestinum decumbat, cum assidua desidendi cupiditate, Diæta Annaleptica instituat, & liquor aliquis Cardiacus pro libitu ingeratur, ut restaurari possint vires, quibus redeuntibus, Tenesmus sponte se proripit.

In dysenteria malè curata dolores aliquando ægrum ad annos aliquot discruciant, in hoc casu Phlebotomia repetita pristinam sanitatem restituet.

Notandum est, quòd in constitutionibus huic morbo minùs faventib. omissis evacuationibus dysenteria Laudano solo sanatur, quod manè & serò repetendum, donec symptomata penitus evanuerint, vel etiam ter Nycthemeri spatio, si opus fuerit.

De Colica biliosa.

Intestinatorum dolor atrocissimus est, per horas aliquot affligit febris in hunc morbum desinens, qui aut quasi injectâ fasciâ constringit, aut in punctum contractus quasi terebello perforat; subinde remittitur, mox recrudescit. Sub initio non ita certò ad unum aliquod punctum determinatur, neque tam crebrevomitatio, neque alvus ita pertinaciter cathartorum vim eludit; quo autem magis auge-

tur dolor, eo obstinatiùs in puncto figitur, vomituritio frequentior & major alvi adstrictio, colicâ tandem in iliacam transeunte. A nephritide sic distinguitur. 1. Dolor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad testem exporrigitur secundum longitudinem ureteris. Colicus verò vagus est, & cinguli instar medium ventrem affligit. 2. A pastu colicus dolor augetur: Nephriticus potius imminuitur. 3. In colico dolore, ab excretionem per alvum & per vomitum majus levamen emergit, quam in nephritico. 4. In dolore nephritico urina primum clara & tenuis, postea aliquid subsidet, & tandem arenulæ aut lapilli excernuntur: In colica urinæ ab initio crassiores existunt.

Sanguis è brachio paulò liberaliùs educatur & post horas *iiij.* vel *iv.* *Anodyn.* exhibeatur. Postero die *Catharticum Lenitiv.* & interposito die uno, ad tertiam vicem propinetur.

At si malum hoc fructibus horariis, vel aliis cibis avidè ingestis, originem debeat, tum ventriculus ante omnia lacte cerevisiato affatim hausto eluendus est; quo exantlato *Anodynum* propinandum est; sequenti autem die vena secanda est, & in ordine præscripto procedendum.

Ubi hic morbus minùs peritè tractatus diutissimè fatigaverit, & ægrum penè confecerit, liberalior sive aquæ *Epidem.* sive *Mirab.* sive aliùs cujuscunque, quâ sanus maximè delectabatur, usus, ægrum hoc tempore ultra se em omnem juvit.

De cholera Morbo.

Intra Augusti limites se continens, vix in priores Septembris hebdomadas evagatur. A crapula & ingluvie excitatus similis affectus, nullo temporis discrimine insurgit, qui licet eodem curetur modo, alterius tamen est subfelli. Adfunt vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distentio; cardialgia, sitis; pulsus celer ac frequens, parvus & inæqualis; æstus & anxietas, nausea molestissima, sudor, erurum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, & similia, quæ ægum in 24 horarum spatio interimunt.

Pullus tenerior in tribus circiter Aq. font. Congii elixetur, ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat, hujus decocti vel (defectu ejus) liquoris possetici capaciores aliquot cyathos æger tepidè exhauriat; & eodem tempore ex eodem liquore *enemata* successivè repetenda. Haustibus & Clysteribus *Syr. Lactuc. Violar. Portulac. Nymph. eorumve*, alicujus uncia subinde admisceri poterit.

Exantlato hoc Eluvionis penso (quod *iiij.* vel *iv.* horas sibi vendicat) *Peregoricum* curationi Coronidem imponit.

Si non accesserit medicus, nisi postquam æger vomitu & dejectionibus per multas horas continuatis fuerit exhaustus, & jam frigescant membrorum extrema, tum ad *Laudanum liquidum* confugiendum est in paulò majori dosi (viz. *Laudan. liquid. gutt. xxv. in Aq. cinnam. fort. 3j.*) & cum cessaverint symptomata, nihilominus manè & serò quotidie est repetendum, at in minori dosi, donec pristinas vires receperit.

Est species quædam cholerae morbi infantibus valdè familiaris, ac sæpenumerò funesta, ex Dentitione vel Crapula originem ducens.

Horum ætas tenella minime fert, ut diluatur ventriculus largâ liquorum potatione, multo minùs ut Catharticis tumultus major in humoribus excitetur, sed Curationem *Laudano* solo aggredi oportet; quamobrem *gutt. ij. iij. vel iv. vel plures*, pro ratione ætatis, *Cochlear. j.* cerevisiæ tenuis vel Aquæ cujusvis appropriatæ instillatæ exhibeantur, repetanturque, ut opus fuerit.

De Colica Pictonum.

Est species quædam Colicæ, quæ degenerare solet in Paralyfin, & motûs omnimodam manuum ac pedum depravationem; quam hoc nomine *Riverius* in capite de Paralyfi indigitat, & apud insulas Caribum notissima est; utpote quæ magnam vim hominum infestat.

Hun

Hunc dolorem atrocissimum sanat *Balsam. Peruv.* frequenter ac in magna dosi exhibitum, nempe si *ejus gutt. xx, xxx, vel xl. Sacchar. albiss. cochl. j. instillentur*, & bis vel ter in die dentur: at Paralytis huic remedio haud cedit.

De iliaca Passione.

Peristalticus intestinorum motus invertitur, propinata cathartica & injecta enemata in emetica statim transeunt, alvi fæces per vomitum rejiciuntur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad ʒiix , vel x . post aliquot horas exhibeatur sequens Pulvis.

\mathcal{R} *Resin. Scammon. vel (defectu ejus) Resin. Jalap. gr. xij. Calomelan. Torquet. ʒj. m. f. Pulvis; cap. è Cochl. j. lactis vaccini, superbibendo ejusdem lactis Cochl. j. vel alterum: vel si forma Pilularum magis arrideat:*

\mathcal{R} *Pil. ex duobus. ʒss. Calomel. Torquet. ʒj. cum s. q. Balsam. Peruv. f. Pill. iv. sumend. e Cochl. j. Syr. Violarum.*

Sin autem æger hoc remedium per os rejecerit, *Laudan. liquid. gutt. xxv. Aq. Cinnamon. fort. ʒss. instillatæ statim propinentur;* cum vero horum usu vomituritio, ac ventris dolores, remiserint, catharticum dictum iterum exhibeatur: verum si anodynorum virtu-

te ac vi jam penitus infractis vomituritio ac dolor iterum redierint, cathartico interim in corpore restitante, ad usum paregorici supra descripti revertendum, idemque eò usque repetendum quartâ vel sextâ quâque horâ donec intestinis quies omnino inducatur, quo quidem tempore catharticum operationem suam per sedes exeret.

Nec sanè abs re fuerit elapsâ horâ unâ, aut alterâ, post Venæsectionem, clysterem aliquem, ex iis qui potentiùs operantur, injicere, fumum scilicet nicotianæ, ex tubulo inverso, per vesicam majusculam, in intestina validissimè insufflatum, quæ quidem operatio post aliquot horas reiterari debet, nisi citius meatus deorsum pateat.

Finitâ operatione Cathartici, sumat sequentem haustum.

R. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Laudan. Liquid. gutt. xxv. m. f. Haustus, qui porrò repetendus, est bis, ter, vel sæpius in die, donec vomituritio & dolor penitus cessaverint; atque etiam, istis symptomatis cessantibus, nihilominus ad curationem confirmandam per aliquot adhuc noctes capiat idem paregoricum in minori dosi cubitum iturus.

De Fluxu Mensium immodico.

Menstruorum fluxus, naturaliter constitutus, capacitatem testæ ovi anserini implet.

Pater

Patet autem immodicus ex difficili tolerantia, virium lapsu, inappetentia, cachexia, colore cadaveroso, & pedum intumescencia.

Mittatur sanguis è brachio ad 3viij. sequenti manè sumatur *potio purgativa communis*, repetaturque alternis diebus ad duas alias vices, & noctibus post purgationem *Paregoric. è Syr. de Mecon.* exhibeatur.

Diebus à purgatione vacuis sumat sequentia.

℞ *Conserv. Rosar. sicc. ʒij. Trochisc. de terr. Lemnia ʒiss. Cort. Granator. Corall. rub. preparat. ʒi boli Armen. an. ʒij. lapid. hematit. Sanguin. Dracon. an. ʒj. cum s. q. Syr. Cydonior. f. Elect.* de quo sumat ad magnitudinem nucis moschat. maj. manè & horâ quintâ pomeridianâ, superbibendo sequentis Julapii Cochl. vj.

℞ *Aq. Germin. Querc. & Plantag. an. ʒiij. Aq. Cinnamom. hordeat; ʒ Syr. de Rosis siccis an. ʒj. Sp. Vitriol. q. s. ad gratam aciditatem.*

℞ *Fol. Plantag. & Urtic. an. q. s. Contundantur simul, ʒ succus exprimatur, ʒ postea clarificetur, de quo cap. Cochl. iv. vel v. sæpiusculè ad libitum.*

Post primam purgationem applicetur emplastr. seq. regioni Lumborum.

℞ *Emplastr.*

R. Emplast. de Minio & ad Herniam an. part. aq. extendantur super alutam, f. Emplastrum regioni Lumborum admovendum.

De Colica hysterica.

Est species quædam, seu potius insigne ac valdè usitatum affectionis hystericæ symptoma, cui comitem se adjungit dolor circa scrobiculum Cordis atrocissimus, uti etiam humorum viridi colore per vomitionem ejectio.

Primo, quò saburra vitiosorum humorum in ventriculo contentorum minùs impediatur Pa-
regorici efficaciam, satis magna quantitas li-
quoris possetrici affatim ingurgitetur, atque ite-
rum per vomitionem rejiciatur, nempe ejusdem
liquoris Cong. iss. quo peracto Laudan. Liquid.
gutt. xxv. in Aq. cinnam. fort. Aq. Epidem. vel
alius vehiculi ʒj. propinentur.

In usu Paregoric. hoc notandum, quòd eò
usque repetendum est, donec symptomata om-
nia penitus cessaverint, debitum interea tem-
pus interjiciendo; ut dijudicare valeamus,
quid prior dosis effecit, antequam novam in-
geramus.

Si sanguineo temperamento præditus sit æ-
ger, vel si antea hoc symptomate haud mul-
tum infestatus fuerit ac viribus fractus, hoc in
casu sanguis primùm è brachio derrahendus
antequam vomitorium præscriptum propine-
tur.

Hæc

* Hâc ipsâ Methodo Clavus hystericus curatur. Sin verò Colica HystERICA diuturnior fuerit per Paroxysmos affligens: tum in eorum intervallis, sive extra Paroxysmum, seq. usurpentur.

℞ Zedoar. subtiliss. pulv. ʒj. cum s. q. Syr. è conditur. citri f. Bolus, sumendus manè & serò per xxx. dies, superbibendo sequentem infusionem.

℞ Zedoar. incis. minutim ʒss. vini Canar. ʒiv. infundantur frigide per xij. horas; deinde colentur pro usu; vel Balsam. Peruv. ut in Colica Pictonum, usurpetur.

Quæ de Colica HystERICA hic dicuntur, de Colica etiam hypochondriaca dicta sunt; ut & hoc diligenter advertendum.

Utriusque affectûs natura sibi vindicare videtur, ut alia atque alia tententur, donec tandem ad illud remedium perventum fuerit, cui quasi genuinè morbus cedit; tametsi ut plurimum Chalybs imprimis confert.

Colica HystERICA tam in hypochondriacis quam hystericis sæpissime in Icterus definit, qui sensim sponte suâ facessit, sin autem longas moras nectat, exhibeatur Apozema sequens.

℞ Rad. Rub. Tinctur. curcum. an. ʒj. chelidon. maj. cum toto & summitat. centaur. min.
an.

*an. M. j. coq. in equalib. partibus Vin. Rhenani
 & Aq. fontan. ad ℥ij. colatur. dissolv. Syr. de
 5 radicibus ℥ij. m. f. Apozema. de quo capiat
 ℥ss. calidè manè & serò, usque dum conva-
 luerit.*

De Ictero, colicâ neutiquam prægessâ.

Color flavus in toto corpore, præsertim in oculorum albis est conspicuus, quo quidem colore objecta omnia apparent affectis tincta, corporis pruritus, segnities, & lassitudo, linguæ amaror, vomitus biliosus interdum, singultus, egestio alba, urina crocea & pannum immersum eodem colore inficiens, morbum indigitant.

Exhibeatur potio purgativa communis, dein aggrediatur usum sequentium; & durante eorundem usu, Catharticum præscriptum quarto quoque die exhibeatur.

*R. Conserv. Absinth. Rom. conserv. flaved.
 Aurant. an. ℥j. Angelic. condit. nuc. moschat.
 condit. pulv. Ari compos. & chalyb. cum aceto
 preparat. an. ℥ss. Extract. centaur. min. Ex-
 tract. Gentian. & cremor. Tartar. an. ℥ij. croc.
 Anglic. pulv. ℥ss. cum s. q. Syr. de 5 radicibus
 f. Electuarium, de quo cap. ad magnitud. nuc.
 moschat. manè & horâ quinta pomeridianâ
 (vel vice Electuarii sumat pilulas chalybeatas)
 superbibendo post matutinam dosin aquarum
 mine-*

mineralium purgantium ℥iv. & post pomeridianam dosin apozemat. in colica hysterica descript. ℥ss.

At si signa hydropis affuerint, tam manè quàm serò apozema superbibat.

Si vel his diu continuatis morbus adhuc obstiterit, ad *aquas ferreas* eundum est, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

Ad præcavendum abortum.

Eadem præscribenda, ac in Fluxu mensium immodico, omissis solummodò catharsi & succis.

De immodico Lochiorum fluxu.

Fluxum lochiorum naturalem tria constituent, sanguis scilicet purus, copiosus, per triiduum primum fluens; dehinc sanguis aquosus, loturæ carniū crassiori similis, per quatruiduum præterpropter durans; hinc postmodum materia viscosa & mucilaginosæ, pauco aut nullo sanguine permixta, per quinque aut septem dies prodiens, & sic porro ad mensis finem.

Fluxus autem eorum immodicus dijudicandus est ex viriū dejectione, animi deliquio, sanguine grumoso effluente, cibi fastidio, dolore in hypochondriis, ventris tensione, pulsū debili

debili & frequenti, visûs obtenebratione, aurium tinnitu, & convulsionibus.

Victus incrassans instituatur, & potus sequens addatur.

℞ *Aq. Plantag. vin. rubr. an. ℥j. coq. simul ad tertias, & deinde edulcoretur s. q. sacchar. albiss. cujus, cum frigescat, cap. ℥ss. bis vel ter in die.*

Interim Julap. aliquod Hystericum (at satis mite) subinde propinetur, & nodulus sequens naribus applicetur.

℞ *Galban. Asæ foetid. an. ʒij. castor. ʒiss. sal. succin. volatil. ʒss. m. f. nodulus, vel*

℞ *Sp. salis Ammoniac. ʒij. quem sæpe olfaciat,*

De suppressione Lochiorum.

Intumescit venter, dolor gravativus inum ventrem, lumbos & inguina occupat, facies rubescit, difficilis est respiratio, perturbantur oculi, rigores febres acutæ adsunt, animi deliquia, sudores frigidi, pulsationis & ardoris sensus in utero, paralyxis in partibus inferioribus, ut & interdum epilepsia.

E vestigio lecto addicatur, & *Emplast. hystericum* umbilico admoveatur quamprimum. Elect. seq. adhibeatur.

℞ *Con-*

℞ *Conserv. Absinth. Rom. Rut. an. ʒj. Trochisc. è Myrrh. ʒij. Castor. croc. Anglic. sal. volatil. Sal. Armoniac. ʒ Asefoetid. an ʒss. cum s. q. Syr. è 5 radicib. f. Elect. cap. ad magnitud. nuc. moschat. quartâ quâque horâ, superbibendo seq. Julap. Cochl. 4 vel 5.*

℞ *Aq. Ruta ʒiv. Bryon. compos. ʒij. Sacchar. cand q. s. f. Julap. vel sumat Trochisc. de Myrrh. ʒj. quartâ quâque horâ.*

Si tota prædictorum quantitas consumatur, & Lochia adhuc supprimantur, *Laudanum* unicâ saltem vice exhibendum; ut, *Laudan. liquid gutt. xiv. in Aq. Bryon. compos. vel. Laudan. solid. gr. iss. cum Asefoetid. ʒss. in pilulas duas redactum.*

Si hæc nihil proficiant, tum Enema ex lacte Saccharato, unicâ saltem vice, injiciatur.

De Hydrop.

Foveæ à digitorum impressione in surarum parte inferiori sub noctem conspicuæ, manè evanescentes, hoc malum primum indicant, maximè si spiritus interim ægriùs ducatur (haud rarò tamen foeminæ prægnantes, & quibus catamenia sistuntur, ut & viri ab asthmate inveterato derepentè liberati eodem tumore tentantur) pedibus cruribúsq; ad extremum extensis, in abdomen ruunt aquæ, & ad ultimum capacitatis suæ limen paulatim distendunt.

dunt, donec tandem in viscera nobiliora impetu ab iis facto æger submergitur. Pro rata qua partes à morbo obsessæ mole augentur, aliæ magis magisque gracilescent, urgentibus dyspnœâ, urinæ paucitate, & siti intensâ. Viros, ingravescente ætate; fœminas, ubi jam parere desierint, ut plurimum adoritur.

Indicationes curativæ dirigendæ sunt primò ad aquarum evacuationem, deindè ad instaurandum sanguinis robur; quò novus aquarum proventus præcaveri possit.

℞ Vini albi ℥iv. Jalap. subtiliss. pulv. ʒj. Zinzib. pulv. ʒss. Syr. de Spin. Cervin. ʒj. M. f. Potio, sumenda summo manè, repetendaque singulis vel alternis diebus, pro ratione viri-um, donec partes affectæ detumuerint; vel,

℞ Tamarind. ʒss. fol. Senn. ʒij. Rhei ʒiss. Coq. in f. q. aq. ad. ʒiij. in Colatur. dissolv. Manna & Syr. Ros. solut. an. ʒj. Syr. de Spin. cervin. ʒss. Elect. è succ. Rosar. ʒiij. M. f. Potio, sumenda, ut supra; vel,

℞ Pil. ex duob. ʒj. Elater. gr. iij. Ol. Chym. Caryophyl. gut. ij. f. Pil. N° iij. cap. summo manè, repetanturque, ut opus fuerit; vel,

℞ Gambogii gr. xv. vin. alb. & aq. Cichor. an. ʒiss. Syr. de Spin. Cervin. ʒss. m. f. Potio sumenda ut supra; vel,

℞ Cortic.

℞ Cortic. interior. Sambuc. è ligno deraſi M. iij. coq. in aq. & lact. partibus aq. miſtorum ℥ij. ad ℥j. Colaturæ capiat dimidiam partem mane, & alteram ſerò quotidie, donec conualeſcat. At hoc remedium, niſi in corporibus, quæ facillimè purgativis cedunt, nihil confert.

Circa uſum Catharticorum in hoc morbo hæc tria advertenda ſunt.

Primo utrùm ægri corpus facilè, an verò difficulter Catharticis cedere ſoleat, cùm in iis qui facilè purgantur Syrup. de Spin. Cervin. ſolus ad ℥j. exhibitus aquas ſat copioſè eliciat; in illis verò, qui difficulter purgantur, Cathartica ſupra deſcripta, utut valida, vix ſcopum attingant.

Secundò, Cathartica omnia, quæ ſegniùs operantur, magis officiunt quam profunt; quamobrem purgatio paulò fortior & nimia juſto debiliori eſt præferenda.

Tertio, Aquæ eâ maximâ celeritate exhauriri debent quam ægri vires ferre queant; ne nimis longa inter purgationes intervalla adhibendo, aq. denuò affatim colligantur.

Eſt autem ubi medicamenta omnia, qualifcunque demum generis, quæ alvum movent, prorſus omitti poſſint ac debeant; quoties enim æger conſtitutione eſt infirmiori, vel fœmina vaporibus obnoxia, aquarum evacuatio Diureticis ſolùm committenda, inter quæ ea ſunt efficaciffima, quæ ex ſalibus Lixivialibus ſunt; ut,

℞ Ci-

℞ Cinerum Geniste ℥j. infundantur frigide in vini Rhenan. ℥iv. liquoris per filtrationem colati ℥iij. manè, quintâ pomeridianâ, & serò singulis diebus exhibeantur, usque dum humor evanuerit.

Aquis jam penitus evacuatis calefacientia & corroborantia medicamenta usurpanda; ut,

℞ Rad. Raphan. Rustican. fol. Cochl. hortens. Absinth. vulgar. Salv. summitat. Centaur. min. & Genista, infundantur in cerevisia forti pro potu ordinario, qui potus incipienti hydropi aliquando sine Catharticis subvenit; vel sequent. utatur;

℞ Conserv. Cochl. hortens. Absinth. Roman. an. ℥j. Extract. Gentian. Absinth. vulgar. & Centaur. min. an. ℥iij. cum. s. q. Syr. è cortic. citr. f. Electuarium, de quo sumat ad quantitatem nuc. moschat. maj. manè, quintâ pomeridianâ, & vesperi, superbibend. ℥iv. sequentis infusionis.

℞ Rad. Gentian. ℥j. summitat. Genist. Centaur min. & Absinth. vulgar. an. M. j. Sem. Fœnicul. & Petroselini an. ℥ij. incis. minutim affunde vini Rhenani ℥iv. stent simul in infusione frigida, & coletur solummodo tempore usûs.

Notandum, cùm ad corroborantium usum deventum fuerit, ægrum nullo modo esse purgandum,

gandum, tantisper dum sanguinis corroborati-
oni navetur opera.

Quod & per salium Lixivialium usum om-
nino observandum, quo quidem tempore pa-
riter corroborare convenit.

*℞ Rad. Raphan. Rustican. ℥iij. fol. Cochl. Hor-
tens. Absinth. vulg. Salvia, summitat. Centaur. &
Genista, an. M. iij. Aurant. incis. N° iij. Infun-
dantur in Congiis vj. Cerevisia fortis non lupula-
ta, inter fermentandum; sit pro potu ordinario.*

De Gonorrhœa virulenta.

Corripiunt dolor genitalium insolitus, & ro-
tatio testiculorum, in non recutitis macula
morbilli æmula glandem occupat, statim à cu-
jus exortu liquor, seminis instar, exstillat, qui
quotidie à feminis colore & consistentia rece-
dens flavescit tandem dilutius ovi vitello; in
lue virulentiore virescit, & aqueo humori per-
miscetur sanguine tincto. Pustula dicta ulcus
fit, aphthis infantum simile indies latius &
profundiùs depascens, superveniente orificii
callo. Verpi non glandis ulcere solâ Gonor-
rhœâ tentantur. Mox magnus dolor in pene,
quoties erigitur; quasi manu transversus forti-
ter constringeretur, noctu præcipuè urget, dum
æger lecto incalescit. Curvatur penis à fræno
contracto. Accedit ardor urinæ, inter mingen-
dum vix perceptibilis, sed mictu finito, per
urethræ

urethræ ductum acriter urens, maximè quâ in glandem definit. Carunculæ lotii exitum quandoque impediunt; & scroti dolor ac inflammatio nonnunquam superveniunt.

R. Mass. Pil. Coch. maj. ʒiij. Extract. Rud. ʒj. Rosin. Falap. & Diagryd. an. ʒss. cum. s. q. Opobalsam. f. Pilul. è singulis drachmis vi. cap. iv. singulis Auroris, donec urinæ ardor & color flavus materiæ seminiformis admodum imminuantur. Postea alternis diebus ad septimanas adhuc duas; ac sub finem bis in septimana, donec humor stillare prorsus cessaverit.

In iis, qui difficulter purgantur, subinde intercalari possit potio communis purgativa, cui addantur, Syr. è spin. Corvin & Elect. Succ. Rosar. an. ʒij. vel. curatione minùs foeliciter succedente Turbith. Minerale ad gr. viij. exhiberi potest bis vel ter, diebus quatuor interpositis, vel vice Turbith. Mineral.

R. Pil. ex. duob. ʒss. Merc. dulc. ʒj. cum. s. q. Opobalsam. f. Pil. iv. summo mane sumendæ.

Si æger à dicta Catharsi abhorreat, post pilulas primò descriptas, tribus Auroris continuis sumptas, tum manè & horâ quintâ pomeridianâ quotidie injiciatur Clyster sequens, nisi quod semel aut bis in hebdomade, omisso Clystere, Cathartic. imperandum.

℞ *Elect.* è *succ. Rosar.* ʒvj. *Terebinth. Venet.*
Vitello ovi solut. ʒss. *dissoluantur in Aq. hord.*
 ℥j. *Colatur. adde Syrup Violar.* ʒij. *M. f. Clyster.*

Singulis noctibus cap. Opobalsam. vel Balsam.
è Mech. gutt. xxxv. Sacch. frustulo exceptas. Hu-
jus defectu Terebinth. Cypr. ad quantitatem A-
vellanæ substitui possit.

Sit pro potu hydrogala; at Cerevisia tenuis
 in pastibus.

Vel sequentem methodum aggrediatur,

℞ *Pil. ex duob.* ʒss. *Opobalsam. gutt. iij. f.*
Pil. N° iij. *Cap. horâ quartâ matutinâ, super-*
dormiendo, repetanturque alternis diebus, vel
tertiâ quâque die.

Diebus à purgatione vacuis injiciatur manè
 & horâ quintâ pomeridianâ Clyster supra de-
 scriptus.

Procedente curatione (quâcunque eâ demum
 methodo tentetur) sanguis sub medium cura-
 tionis semel vel bis mittatur, & diæta refrige-
 rans & incrassans præscribatur, & medicamen-
 ta iisdem virtutibus pollentia, qualia sunt *hy-*
drogala, Emulsiones ex seminib. frigid. &c.

Si Penis Tumore afficiatur,

℞ *Rad. Althææ, Lilior. an.* ʒiss. *fol. Malv.*
Verbasc. Sambuc. Hyoscyam. flor. Chamamel. Me-
lilot. an. M. j. sem. Lini, Fœnugrac. an. ʒss. *coq.*
ʒ q. Aq. font. & f. f. totus parti affectæ admo-
vendus per horæ unius spatium bis vel ter in
die.

D

Per-

Peraclâ fomentatione, perungatur pars affecta ol. sem. Lin. rec. extract. dein *Emplast. è mucilaginis alutæ agninæ inductum* labiis præputii tumidis circumponatur.

Si Ulcus in præputii labiis, vel in subjecta Glande, hæreat, tum sequens Linimentum præscribatur.

℞ *Unguent. Basilic. ʒvj. Unguent. Nicotian. ʒij. precipitat. Aq. Rosar. loti & optimè levigat. ʒss. M. f. linimentum*, quo lintei rasura imbutur, & ulcusculo admoveatur semper post fotûs præscripti usum.

Si scrotum tumore afficiatur, statim sanguis è brachio extrahatur, atque bis in die fots præscriptus parti affectæ admoveatur, singul. fotibus addendo *Sp. vin. Gallic. Cochl. j. vel alterum, vel Cataplasma ex Oxycrato & farina fabarum* ejus loco applicandum.

Catharticis interim & refrigerantibus modò descriptis introsumptis utendum est.

De Lue Venerea.

Ubi aut à Gonorrhœæ mora, aut indebito astringentium usu labes sanguini imprimitur, exoritur Lues. Comparent in inguine bubones, in capite dolores & artibus, articulorum interstitiis, noctu præcipuè invadentes in lecto calidos, crustulæ & porrigines in variis corporis partibus, quæ ad instar favi flavescent. Quo
magis

magis scabies diffunditur, tanto minùs æger discruciat. In cranio, tibiis brachiisque exostoses, ossium inflammatio & caries; ulcera phagædenica in variis partibus, sed fauces ut plurimum primò aggredientia, quæ sensim per palatum in nasi cartilaginem propagata mox eam absumunt, ita ut fulcro destitutus nasus planè concidat. Ulceribus, carie & dolore indies exacerbatis, pereunt per vices membra; lacerum donec cadaver, & jam Superis grave humo condatur.

℞ *Axung. Porc. ℥ij. Mercur. crud. ℥j. M. f. Linimentum*, in tres æquales partes dividendum, quarum unâ brachia, crura & tibiae ad tres noctes continuas manibus suis æger perungat.

Si intra tres dies post ultimam inunctionem salivatio haud procedat, tum *gr. viij. Turbith. mineral. in Conserv. Rosar. rubr. exhibeantur*; aut corporibus minus robustis, *Merc. dulc. ℔j.* Sed si salivatio jam incepta priùs elanguescat, quàm symptomata penitus disparuerint, extimulanda subindè est eadem dosi *Mercur. dulc.*

Ptyalismus ita moderari debet, ut *℥iv.* Nycthemeri spatio expuat, aut circiter.

Si justo altiùs exurgat Ptyalismus, cum inflammatione nimia, atque id genus symptomatis ingruentibus, aliquantulum reprimendus est medicamentis Catharticis, donec debitum gradum attingat.

Quamprimum symptomata cessaverint, statim immutentur indusium & tori lintea; ac sint ea, quæ prius usurpata fuerint.

Si Diarrhoea supervenerit (quod plerunque accidit antequam salivatio bene assurgat) tunc sistenda est usu Laudan. Liquid. ita dosin augendo atque repetendo, ut debitum opus absolvat.

Si os exulceretur, *Aq. Ros. Damascen. vel lacte Aq. permisto*, vel seq. decoct. idem collatur.

℞ Rad. Alth. Hord. mundat. an. ℥j. sem. Cydonior. ℥ss. coq. s. q. aq. ad ℔ij. M. f. Gargarisma, quo sæpius utatur.

Dietæ & reliquum ægri regimen, eadem ac in Catharsi imperanda, nisi quod primis aliquot diebus liquore possético, jusculis avenac. hordeac. ac cerevisiâ tenui tepefactâ nutriatur.

His omnibus ritè peractis (etiâ si symptomata omnia evanuerint, ac subindè morbus penitus profligari videatur) quo minùs recidivam postliminio patiatur, ægro semel in septimana per 4 vel 6 vices, *Merc. dulc. ʒj.* exhibendus, utcunque bene se habeat, & etiâ si jam domo egrediatur.

De Fluore albo.

Quod effluit, modò album, modò pallidum, flavum, viride aut subnigrum, modò acre &

cro-

erodens, tetrum quandoque & graveolens, decoloratur facies, dolet spina dorsi, prosternitur appetentia, oculi pedesque intumescunt.

Mittatur sanguis è brachio ad ℥viij .

\mathcal{R} *Pil. Coch. maj.* ℥ij . *Castor. gr.* ij . *Balsam. Peruv. gutt.* iiij . *f. Pil. N° iv.* cap. horâ quartâ matutinâ, superdormiendo; repetanturque per duas alias vices interponendo diem unum vel alterum pro ratione virium.

\mathcal{R} *Aq. Rut.* ℥iv . *Aq. Bryon. comp.* ℥ij . *Sacchar. Crystal. q. s. f. Fulapium*; *Cap. Cochl.* iiij . vel iv . in omni languore; deinde aggrediatur usum sequentium.

\mathcal{R} *Theriac. Andromac.* ℥iss . *Conserv. flaved. Aurant.* ℥j . *Diascord.* ℥ss . *Zinzib. condit.* ℥ *nuc. moschat. condit. an.* ℥iiij . *Pulv. è Chel. cancer. comp.* ℥iss . *cort. exterior. granat. Rad. Angelic. Hispan. corall. rubr. preparat.* ℥ *Trochisc. de terra Lemnia an.* ℥j . *Boli Armon.* ℥ij . *Gumm. Arabic.* ℥ss . *cum s. q. Syr. de Rosis siccis f. Ele-ctuar. de quo sumat ad magnitud. nuc. moschat. maj. manè, horâ quintâ pomeridianâ, & nocte per mensem integrum, superbibendo sequent. infusionis Cochl. vj.*

\mathcal{R} *Rad. Enul. campan. Imperator. Angelic. Calami Aromat. an.* ℥ss . *fol. Absinth. Roman. Marrub. alb. Centaur. min. Calamenth. vulg ar.*

Salv. sicc. an. M. j. Bac. Junip. ʒj. incidantur minutim & infundantur in Vini Canarini tbiv. stent simul in infusione frigida, coletur tantummodo tempore usûs.

Vescatur cibis eupeptis, & absteineat ab usu olerum & fructuum qualiumcunque, & singul. partibus bibat vinum Hispanicum.

De Diabete.

Succi sanguini illati per vias urinarias crudi & inconcocti exitum sibi quærunt, unde sensim labefactantur vires, colliquescit corpus, & quasi substantia ejus per hanc cloacam exinanitur cum siti, ardore viscerum, lumborum coxarumque intumescentiâ, & salivæ spumosæ expuitione crebrâ.

Eadem præscribenda sunt, quæ in fluore albo, omissis solummodò Venæsectione & Catharsi.

De Dolore Hemorrhoidum.

Intensissimus inter excernendum dolor excruciat, & excrementi superficies cruore conspergitur: Nonnunquam tumores verrucis similes in sphinctere delitescent, vel in margine ani apparent.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad ʒx.

R. Sem. Melon. Pepon. an. ʒss. sem. Papav. alb. ʒij. Amygd. dulc. excorticat. N° v. contundantur

tundantur in mortario marmoreo, sensim affundend. Aq. Hord. ℥iiss. Aq. Rosar. ℥ij. Sacchar. albiss. q. s. f. s. a. emulsio; cap. ℥iij. sæpiuscule.

℞ Flor. Sulphuris, Pulv. Glycyrrhiz. Salvia an. 3j. cum s. q. Balsam. Lucatel. f. Pil. è sing. 3vj. cap. iij. ter in die, superbibend. Emuls. præscript. Cochl. vj.

℞ Aq. Spermat. Ranar. ℥iv. in qua dissolv. Lithargyr. ℥ij. Opii ʒj. f. mixtur. cujus tantillo Linteum madefactum parti affectæ applicetur, vel si tumor intus lateat, Cochl. iij. ejusdem mixturæ modo Clysteris injiciantur.

Pro Potu ordinario bibat aquam cum lacte coctam, vel aquam hordei; & à carnis usu abstineat. Singulis noctibus sumat Diacodium.

De fluxu Hemorrhoidum immodico.

Innotescit ex viribus prostratis, copia & diuturnitate sanguinis excreti, foedo corporis colore, ad citrinum (ut in Ictero) vergente. Succedit cachexia, & deinde hydrops.

Eadem conferunt, quæ in fluxu mensium immodico, omisâ solummodò Catharsi.

De Epilepsia Puerorum.

Vel primo mense aggreditur à frequentibus nimis alvi dejectionibus (quo in casu Diascor-

dium ad quantitatem grani piperis in Aq. Saxi-frag. aut lacte materno solutum, & exhibitum præstantissimum est remedium.) Vel circa dentitionis tempus, à septimo ad decimum mensem, tussi comitata est, aut (quod multo deterius) vomitu & diarrhoeâ, viridia (ut solent hystricæ) egerente infante. Quandoque improvisò occupat paroxysmus, os oculosque distorquens, nigredine vultum perfundens, & artus varios convellens; quandoque præsentitur ex digitorum in pugnum contractione, & ex stabili & insolitâ oculorum orbitarum immobilitate. Nunc seriùs nunc ocyùs se proripiunt paroxysmi, certâ subinde periodo, vago alias insultu revertentes; sed, appetente morte, à tergo se invicem premunt: Si quando inducias dent, in soporem proclives sunt infantes, donec à novo resuscitentur insultu.

Applicetur *Emplast. Epispastic.* cervici quamprimum.

R. Aq. Epilept. Lang. ℥iij. Laudan. Liquid. gutt. j. vel ij. vel plures, pro ratione ætatis, Syr. Paon. 3j. M. f. Haustus, sumendus quamprimum.

R. Aq. Ruta ℥iij. Aq. Epilep. Lang. & Aq. Bryon. comp. an. 3j. Syr. Caryophyll. 3ss. M. f. Fulap. cap. Cochl. j. singulis horis, si haustus præscript, paroxysmum non fugaverit.

De Rachitide.

In Rachitide adfunt partium laxitas & mol-
lities, debilitas & languor, ignavia & torpor,
& inæqualis earundem nutritio, viz. caput ju-
ſto majus, facies plenior & floridior, partes
carnofæ infra caput emaciantur, nodis protu-
berant articuli, maximè carpi, paulo minùs
tali, tument & extremitates coſtarum, oſſa
incurvantur, præcipuè tibix & fibulæ, hinc ul-
næ & radii, aliquando femoris & humeri,
dentes tardè & moleſtè erumpunt, vacillant,
nigrefcunt & fruſtulatim excidunt, peçtus à
lateribus anguſtum, anteriùs acuminatum, ab-
dominis repletio, & hypochondriorum tenſio,
tuſſis & pulmonum vitia laceſſunt, lateralis
decubitùs modò dextri, modò ſiniſtri averſa-
tio.

℞ Fol. Absinth. vulgar. Centaur. minor. Mar-
rub. alb. Chamædryos, Scordii, Calamenth. vulg.
Parthen. Saxifrag. pratens. Hyper. Virg. aurea,
Serpill. Menth. Salv. Ruta, Card. Benedict. Puleg.
Abrotan. Chamamel. Tanacet. Lilior. convall. om-
nium rec. collect. & incis. an. M. j. axung. Por-
cin. ℥iv. seu. ovin. & Vin. claret. an. ℥ij.
macerentur in olla fictili super cineres calidos per
horas xij. deinde ebulliant ad humiditatis con-
sumptionem, & postea colentur, ut f. Linimen-
tum, quo venter & hypochondria illinantur

manè & serò, ut etiam & artus hoc malo affecti, per 30 vel 40 dies, vel donec convalescerit.

R. Singulor. ingredient. præscript. an. M. ij. infundantur frigidè in Cerevisiæ non Lupulat. Cong. iv. pro potu.

In Tumoribus Infantum ventres occupantibus ab evacuationibus nimis procedentibus,

Sanguis & Viscera herbis corroborantibus confortentur, ut in Rachitide vera nisi quod axillæ etiam utræque inungantur, at non artus.

De Febris à Dentitione Ortis.

Sp. C. C. gutt. ij. vel iij. vel iv. pro ratione ætatis in Cochl. j. vel altero Aq. Cerasor. nigr. vel Julap. alterius appropriati, exhibeantur quartâ quâque horâ ad vices quatuor, vel sex.

De Febre hæctica Infantum.

Sine insigni calore languent cum appetitûs dejectione, artus & truncus corporis emaci-
antur.

Rhabarb. incisi ʒij. in lagenam vitream cerevisiæ tenuis ℥ij. capacem immittantur pro potu ordinario.

Epoto hoc liquore, *alia ℥ij. eidem Rhabarb. superaffundantur ad tertiam vicem.*

Si verò potus vi Catharticâ saturatius imprægnetur, tum ℥j. epotâ alteri cerevisia mox adjiciatur.

De Tussi Puerorum Convulsiva.

Phlebotomiâ, & repetitâ Catharsi, eâque solâ, expugnatur hæc tussis, malum aliàs pertinacissimum, & fere insuperabile; sed leniora tantum cathartica hic conveniunt, eaque cochleatim ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

De Hemorrhagia Narium.

Dolor & calor sinciput lancinant;

Sanguis è brachio frequenter extrahatur; vitæ ratio refrigerans & incrassans injungatur; Julap. refriger. & incrassans, cum Emulsionib. refrigerantib. præscribantur.

Singulis diebus injiciatur *Enema refrigerans*, atque omni nocte *Paregoric. ex Syrup. de Mecon.* exhibeatur, & semel vel bis *potio purgativa commun.* præscribatur.

Lintea quadruplicata immersa Aq. frigida, in qua sal Prunell. dissolvatur, & postea leviter expressa admoveantur nuchæ, & utrinque cervici sæpius in die.

Post Evacuationes liquor seq. applicetur,

℞ Vitriol. Hungaric. ℥ Alum. an. ʒj.
Phlegmat. Vitriol. ℥ss. Coq. tamdiu, donec om-
nia fuerint dissoluta, liquorem frigesactum filtra,
& à Crystallis subinde natis separa, liquori resi-
duo adde Ol. Vitrioli duodecimam partem; vel
potius,

℞ Aq. Plantag. ʒiij. Bol. Armon. subtiliss.
pulver. ʒss. probè misceantur; Turunda ex
linteo raso liquore hoc humectata, nari, ex quo
sanguis stillat, indatur per dies duos istic re-
linquenda.

Hoc minus succedente, Vitriol. Rom. Aq.
commun. dissolvatur, qua Turunda imbuta nari
indatur, liquore etiam hoc lintheamina imbuta,
& applicata sanguinem sistunt si ex parte ex-
terna diffuat.

De Chlorosi.

Adsunt vultûs & totius corporis decolora-
tio, intumescencia in facie, palpebris &
malleolis, gravitas totius corporis, crurum
ac pedum tensiva lassitudo, respiratio diffi-
cilis, cordis palpitatio, capitis dolor, pulsus
febrilis, somnolentia, pica & mensium sup-
pressio.

Su mat

Sumat *Pilulas Chalybeatas*, vel *Pulv. Chalybeatum* in affectione hysterica præscript. plus minus pro ratione ætatis, superbibend. haustum vini cujuslibet ad libitum, vel infusion. corroborant. cum Rad. Angelic. ibidem descriptam. Si Ægra non valde debilis fuerit, purgetur semel vel bis ante præscriptorum usum.

De Suppressionione Mensium.

Cibum fastidiunt mulierculæ, foedus faciei color est, gravitas totius corporis, doloresincipitis, lumborum, crurum & imi ventris; pedum tumores infestant.

Eadem præscribenda ac in Hysterica affectione; at si iisdem remediis affectus non cesserit, tum seq. sunt præscribenda.

Singulis Auroris, & quartâ pomeridianâ, sumat *Fulap. Hysteric. sine Castor. Cochl. v. instilland. Sp. C. C. gutt. xij.* Singulis noctibus sumat cubitum itura *Trochisc. de Myrr. ʒj. cum Syr. de Artemis. in formam Boli vel Pil. redact.*

De Vomitu sanguinis, vel etiam de Hæmoptoë.

In Hæmoptoë dolor & calor pectus obsident, cum debilitate quadam.

Mittatur

Mittatur sanguis ex brachio dextro ad 3x.
Sequenti mane sumat *portionem purgativ. commun.* & eadem nocte *Paregoric. ex 3iij. Aq. Cerasor. nigr. & Syr. de Mecon. 3j.*

Postea aggrediatur usum sequent.

℞ *Bol. Armon. 3j. Pulv. Radic. Symphyt. 3ij. Ter. sigillat. Lapid. hematit. & Sang. Dracon. an. 3j. Sacchar. albiss. ad pondus omnium. M. f. Pulvis subtilissimus, cujus cap. 3j. manè, quintâ pomeridianâ, & nocte, superbibend. sequent. Apozemat. 3iv.*

℞ *Fol. Plantag. Rubi Sylvestris, & Millefol. an. M. j. coq. s. q. Aq. ad 1/2 ss. in Colatura dissolv. Syrup. de Symphyt. 3ij. M. f. Apoze-
ma; Vel cap. Cochl. vj. sequent. Tincturæ.*

℞ *Flor. Ros. rubr. 3vj. Cort. intern. querc. 3ss. sem. Plantag. parùm contus. 3iij. Aq. font. 1/2 ij. Sp. Vitriol. q. s. ad levem aciditatem, infundantur in vase clauso, calore leni, per 4 horas; Colatur. adde Aq. cinnam. hordeat. 3iij. Sacchar. albiss. q. s. ut. f. Tinctura gustui grata.*

Si ab usu Pulveris abhorreat, utatur E-
lectuario in fluxu mensium immodico præ-
scripto.

Enema quotidie injiciatur, & Diacodium
horâ somni propinetur.

Phlebotomia insuper semel, bis, vel ter (ut opus fuerit) reiteretur, diebus aliquot interpositis; & semel iterum, si res postulet, repetatur potio purgativa.

Diæta incrassans & refrigerans observanda.

De Punctura Tendinis.

Humor aqueus, vel ichor quidam, ex orificio venæ incisæ jugiter distillat.

℞ Rad. Lilior. alb. in lacte vaccin. ad ténueritud. coct. & contus. ℥iv. farin. sem. Lin. & avenac. an. ℥iij. coq. ad cataplasmatís consistentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere, applicetur parti affectæ manè & ferò.

De Ambustis.

Foveatur pars affecta linteis Sp. Vini imbutis, usque dum evanescat dolor, ac deinceps de novo imbuatur linteum, quod ter vel quater in die parti affectæ applicetur.

De Mania communi.

A nimis exaltata & vivida sanguinis crasi oritur. Est & alia manix species febres intermittentes diuturniores excubiens, in stultitiam tandem

tandem degenerans, producta quidem à debilitate & vappiditate sanguinis, à diutina fermentatione. Præscribantur itaque cardiaca generosiora, viz. *Theriac. Andromach. Electuar. de ovo, Pulv. Comitiff. Pulv. Gualt. Rawleigh, in Aq. Epidem. Theriacal. vel aliâ*; & diæta instituaturs analeptica.

In junioribus mittatur sanguis è brachio ad ʒviij. vel *ix.* bis vel ter, diebus tribus inter singulas Venæsectiones interpositis. Tum semel extrahatur sanguis è venis jugularibus. Postea tota curatio innitatur sequenti Cathartico, quod sumat tertiâ vel quartâ quaque die, donec convaluerit; hoc interim observando, quod cum octies vel decies purgatus fuerit æger, exhibitio Cathartici ad septimanam unam vel alteram omittatur.

℞ *Pharmac. domestic. (i.e. Rad. Bryon. alb.) pulv. ʒj. lactis vaccin. ʒiv. vel,*

℞ *Ejusdem ʒss. vel ʒvj. Vin. alb. ʒiv. infundantur per noctem, in colatura dissolv. Syr. Violar. ʒj. M.f. Potio; vel,*

℞ *Gombogii gr. xiv. Aq. Cerasor. nigr. ʒiij. Syr. Caryophyll. ʒss. f. Potio.*

De Contusionibus.

Mittatur sanguis è brachio lateris magis affecti ad 3x. seq. manè exhibeatur *potio communis purgativ.* ac deinceps eodem modo *Venæsectio* & *purgatio* alternatim repetantur, donec æger convaluerit. Interim toto decursu, si internæ partes lædantur, sequentia præscribantur.

℞ *Decoct. Pectoral.* ℥iss. *Syr. Violar. cap. Ven.* an. 3ij. f. *Apozema*; cap. ℥ss. ter in die. Item *Ol. Amygd. dulc. rec. Coch. j.* sæpius propinetur.

℞ *Ol. Amygd. dulc. unguent. Dialth. & Pomat.* an. 3j. M. f. *Linimentum*, quo ungatur pars læsa manè & serò, superimponend. fol. *Brassicæ.*

De fursure sive porrigne capitis.

Potio purgans communis bis propinetur, dein

℞ *Ol. Amygd. Amarar. & Laurini, Cinerum fol. Abrotani* an. 3j. *misceantur probè, & f. Linimentum*, quo inungatur totum caput singulis matutinis, diligenter infricando, & postea superimponendo vesicam suillam.

At

At primùm abradatur totum capillitium, & postea defricentur squammulæ sensim singulis auroris, prout decidere pronæ fuerint.

De Morsu canis Rabidi.

Post 40 dies aut plures melancholica adfunt symptomata, febris, fitis, hydrophobia, & tandem partium extremarum convulsio.

℞ Sp. vin. optimè rectificat. ℥iv. Theriac. Andromach. ℥j. f. mixtura, qua illinatur pars læsa ter in die, superimponendo linteam eadem mixturâ imbutum.

De Ulcere Vesicae.

Pus graveolens, aut sanguis nonnunquam squammulæ seu pelliculæ membranaceæ ac veluti furfuraceæ crustulæ (sin in renibus hæreat ulcus, carunculæ minutulæ aliquando crassiores) unà cum urina excernuntur, perpetua dysuria & continuus earum partium dolor infestant; renibus autem affectis ulcere, dilucida dysuriæ, & doloris dantur intervalla, pus etiam excretum copiosius est, album, leve & minimè foetidum, lacti similis profunditur urina: & longè post mictionem pus ab eo separatum in fundo residet.

℞ Em-

℞ *Emplast. Flor. unguent. dict. 3iss. f. Pil.*
 N° ix. cap. iij. horis medicinalibus superbi-
 bendo sequentis Aq. Coch. vj.

℞ *Rad. Fœnicul. Consol. Aristoloch. & Caryo-*
phyll. an. 3iij. fol. Agrimon. Hyper. Bugul. Sa-
nicul. Plantag. an. in vj. incidantur minutim,
& distillentur in vini alb. & lact. an. ℥iv. &
eliciantur solummodo ℥iv. pro usu.

℞ *Pulv. Rad. Consolid. maj. & Gumm. A-*
rabic. an. 3j. Sacchar. Penid. 3ij. f. Pulv. cap.
Coch. j. bis indie.

De Asthmate inveterato in iis, qui sanguineo
temperamento præditi sunt.

Dividitur in tres species; Dyspnœam, quæ
 difficilis est respiratio, in qua crebrior densior-
 que est spiritûs tractio ex infarctu pulmonum
 sine stertore oriunda: Asthma ubi frequens &
 magna respiratio in qua diaphragma, muscoli
 intercostales, tum etiam abdominis, violenter
 moventur, cum stertore & sibilo. In priore
 specie substantia pulmonum, in posteriore
 bronchia oppilantur: Et Orthopnœam, quæ
 est maxima spirandi difficultas, sub qua ægro-
 tantes non nisi sedentes, & erectâ cervicere-
 spirare possunt. Musculi etiam pectoris & sca-
 pularum vehementer exagitantur.

Mitta-

Mittatur sanguis è brachio dextro ad 3x. Die sequenti sumat *portionem purgativam communem*, quæ repetatur tertiâ quâque die per duas alias vices.

Diebus à Purgatione vacuis sumat sequentia.

℞ *Sem. Annis. subtiliss. pulv. ʒij. cum f. q. Balsam. Lucatell. f. pil. ex singulis drachmis vj. cap. iij. manè & quintâ pomeridianâ, superbibend. decocti Amari sine purgantibus ʒiv. calidè.*

Si Symptomata adhuc maneant, repetatur de novo integer Processus.

De Paralyfi.

Sensus & Motus in partibus quæ afficiuntur, vel simul, vel alterutra tantùm facultas aut prorsus extinguatur aut vitiatur,

Sumat *pil. Cochl. min. ʒij. alternis matutinis per vj. vices; deinde capiat ter in die per xxx. dies Electuar. Antiscorbutic. ʒij. superbibend. Aq. Antiscorbutic. Cochl. vj. Vide in Scorbuto.*

℞ *Unguent. Nervin. ʒiij. Sp. Lavendul. comp. ʒ Sp. Cochl. hortens. an. ʒiss. M. & inungantur partes affectæ, ut spina dorsi, &c. manè & serò.*

Plera-

Pleraque præscriptorum, utut curationi scorbuti solùm destinari videantur; attamen cùm humores crudos ac fixos volatilifare præ aliis apta nata sunt, in Paralyfietiam conveniunt.

De Tussi & Phthisi.

Tussis per se patet. Phthisis autem invadit ab ætatis anno 18 ad 35. Extenuatur totum corpus. Febris molestat hectica, à cibo invalescens (quæ ex celeritate pulsûs, rubedinéque genarum dignoscitur) materia per tussim excreta cruenta est aut purulenta; in ignem conjecta tetrum spirat odorem, & immissa in vas aquâ repletum, fundum petit. Sudores nocturni superveniunt, livescunt tandem genæ, facies pallet, exacuantur nares; temporum quoque collapsus, unguium incurvatio, capillorum defluxio, & alvi profluvium colliquativum, mortem statim subsecuturam denunciant.

Si Tussis recens fuerit, & nondum febrim, aut alia signa Peripneumoniam notham comitantia, accersiverit, vel si à Pleuritide, aut Peripneumoniâ, ob neglectam sufficientem Phlebotomiam, malè curatis eadem nequaquam orta fuerit, fatis erit, ut æger per dies aliquot ab usu vini & carnis abstineat, & his similibus remediis ad libitum utatur.

Balsa-

Balsamum sulphuris anisatum ad gutt. x. Cochl. j. Sacchar. cristall. instillatum bis vel ter in die devoretur; ut etiam Tabellar. sequent. quas secum æger continuò portet, unam frequenter assumat.

℞ *Sacchar. cand. ℥ss. coq. f. q. Aq. font. usque dum adhærescat extremis digitor. tum adde pulv. Glycyrrhizæ, Enul. campan. sem. Anis. & Angelic. an. ℥ss. pulv. Irid. Florentin. Sulphur. an. ʒij. Ol. Chym. Anisi ʒij. f. s. a. Tabella domestica vocand. atque hoc interim Eclegmate utatur.*

℞ *Ol. Amygd. dulc. ʒij. Syr. cap. Ven. Violac. an. ʒj. Sacchar. cand. q. f. f. Lohoch. de quo sæpius lambat bacillo Glycyrrhizæ, quando tussis urget.*

In defluxione tenui *Eclegmata* *incrassantia* exhiberi poterint.

Sin verò Tussis his remediis haud cessaret, (præcipuè autem si febrim comitem habeat, vel si à Peripneumonia aut Pleuritide originem ducat) tum ineptum fuerit pectoralibus fidere; sed Venæsectione & Catharsi debellanda est, ut in methodo, quæ in curatione Peripneumonix nothæ describitur.

Verumenimverò cùm, his omnibus non obstantibus, Tussis non modò non curationi cesset, sed & diuturnâ Pulmonum concussione

eos

eos adeò debilitaverit, ut Phthisis tandem sub-
ingressa fuerit tum hâc methodo proceden-
dum.

■ *Balsam. Peruv. gutt. x. instillentur Cochl.*
j. Syr. Hedera. terrestris, vel si id minus gra-
tum fuerit ægro, Coch. j. Sacchar. crystal. cap.
ter in die, superbibendo Decocti Amari sine pur-
gantib. ℥iv. vel (si idem ventrem moverit)
℥iii.

Sed omnibus aliis (quotquot adhuc inventa
sunt) *Equitatio* ad satis longa & diutina itinera
facilè palmam præripit, hoc observando, ut
si æger juvenilem ætatem prætergressus fue-
rit, plus temporis huic exercitio impendere
debet quàm si puer aut juvenis esset, & sanè
haud multò certius *Cortex Peruv.* feбри inter-
mittenti, quàm in hac ætate *Equitatio* Phthisi
medetur.

De Scorbuto.

Adfunt spontaneæ lassitudines, corporis gra-
vitas, dyspnœa, præcipuè ex motu corporis,
gingivarum putrefactio, oris graveolentia, san-
guinis è naribus crebra eruptio, ambulandi
difficultas, crurum nunc intumescencia, nunc
extenuatio, in iisdem perpetuo maculæ lividæ,
plumbæ, flavæ, aut violacæ, faciei color ple-
rumque ex pallido fuscus.

Ex:

Extrahatur sanguis è brachio ad ℥viij. nisi signa Hydropis adfuerint: Seq. manè exhibeatur Potio Purgat. communis, quæ repetatur tertiâ quâque die per duas alias vices.

Diebus à purgatione vacuis, ut etiam postea, per mensem unum vel alterum sumat equentia.

℞ *Conserv. Cochl. hortens.* ℥ij. *Conserv. Lugul.* ℥j. *pulv. Ari compos.* ℥vj. *cum. s. q. Syr. Aurantior. f. Electuar.* de quo cap. ad magnitud. nuc. moschat. maj. manè, quintâ pomeridianâ & nocte, superbibendo *Aq. Raphan. compos. Cochl. vj.* vel sequentis.

℞ *Rad. Raphan. Rustican. raspat.* ℔ij. *rad. Ari ℔j. fol. Cochl. hort. M. xij. fol. Menth. Salv. Nasturt. aquat. & Becabung. an. M. vj. Sem. Cochl. hort. parum contus. ℔ss. nuc. Moschat. ℥ss. Vin. alb. ℔xij. distillantur organis communib. & eliciantur solummodo ℔vj. pro usu.*

Vel *Folia rec. Cochl. hortens.* per se distillantur pro usu dicto.

Porro sequens cerevisia fit pro potu ordinario.

℞ *Rad. Raphan. Rustican. recentis incisi* ℥ij. *fol. Cochl. hort. N° xij passular. enucleat. N° vj. Aurant. cum toto incisi dimidium, in lagenam vitream ℔ij. Cerevisia tenuis capacem subere mox probè obturandam immittantur.*

In hunc modum parentur eodem tempore sex Lagenæ pro usu, & post aliquot dies sex aliæ, antequam priores exhauriantur, & sic deinceps; vel

Vice hujus Cerevisiæ seq. mixturæ Cochl. *ij.* vel *iv.* immisceri poterint singulis haustibus potûs communis.

℞ Rad. Raphan. Rustican. ℥ sem. Cochl. hortens. an. ʒss. fol. Cochl. hortens. M.ij. pul-
pam unius Aurant. Contundantur simul in mor-
tar. marm. sensim affundendo vin. alb. ℥ss. Co-
letur cum levi expressione, & reponatur pro
usu.

Eadem remedia, Phlebotomiâ & Catharsi
omissis, in Rheumatismo scorbutico, sive Hy-
sterico, valde profunt.

Tabis Descriptio & Cura.

Plures sunt Tabis species: Prima fere ori-
tur è frigore hyeme contracto. Paulo enim
ante solstitium Brumale quamplurimi ab in-
gruente tempestate frigidâ, tussi tentantur.
Quæ cum illos invaserit quibus pulmones ab-
ortu sunt infirmiores, omnino necesse est ut à
repetitis Tussiendi conatibus magis adhuc de-
bilitentur; atque ita tandem alimento sibi
proprio assimilando, præ mala *διαθήσει*,
prorsus impares reddantur. Hinc jam ingens
E Pitu-

Pituitæ crudæ copia aggeritur, quæ continuâ Pulmonum agitatione & vehementi nisu affatim per os rejicitur. Pulmones exinde pure referti purulenta *μιάσματα* quaquaversum in carnes dispergunt. Hinc enascitur Febris putrida, cujus Paroxysmus sub vesperam fatigat, sub auroram vero sudore copioso ac vires imminuente solvitur. Denique ad malorum cumulum Diarrhœa succedit, partim ab humoribus putridis ex arteriis Mesentericis in intestina depositis excretisque, partim à labefactato pessundatoque viscerum Tono. Atque ita demum æger proximâ æstate fato suo fungitur, à morbo, cui prægressa Hiems viam straverat, extinctus. Atque hæc est præcipua Tabis species.

Porro cum sanguis hac tempestate particulis humidis admodum scateat, perspiratioque à subitâ pororum contractione plus satis inhibeatur, particulæ hæ in pulmones depluunt per interspersos Venæ Arteriosæ ramos; vel per Ductus Salivales in glandulis fauces occupantibus reponuntur; unde jam humor per Asperam Arteriam delapsus in Pulmones, Catarrhi ritu, eos ita jugiter irritat, ut creber & vehemens tussendi conatus, tum illam debilitatem, tum alia quæ diximus symptomata, brevi accersat. Cumque non jam amplius naturalem sibi pulmones œconomiam statumque tueri valeant, Glandulæ & Tubercula adna-

fei

sci solent; quæ in ægris ex hoc morbo decedentibus, si aspiciantur pulmones, purulentâ sanie, ut plurimum distenta reperiuntur.

Ubi semel invaluerit hic morbus, & radices egerit, remedia plerumque aspernatur. Tentari utcumque potest Medicatio, minuendo causam defluxionis in pulmones, pertusâ in Cubito Venâ, Catharticis mitioribus; tum medicamentis pectoralibus dictis, ad varios morbi status accommodatis, incrassantibus sc. ubi humor subtilior & tenuior vim Expultricis facultatis videtur eludere; attenuantibus verò ubi pituita crassior ægre & cum molestiâ per os rejicitur. Dein & hæctica Febris remediis refrigerantibus contemperantibusque coercenda. Talia sunt *Lac Asinum*, *Aqua Lactis Stillatitia*, *Emulsiones ex Amigd. dulc. Sem. Melon. Pepon. Papav. alb. Aq. El. Paralys. &c.* Denique & curando Ulceri opera danda est; cui rei Terebinthina illa liquida, Opobalsamum vulgo dicta, apprimè conferre censetur.

Hujusce Morbi Curatio, me Judice, hâc methòdo optimè ac felicissimè instituetur. Primum educatur è brachio sanguis, dein subducatur Alvus ad tres dies continuos, vel *Pil. Cochli majoribus*, vel *Decocto leniente à nobis præscripto*. Tertiâ nocte exhibeatur *Syr. de Mec. 3ss*. Intermisso biduo, triduoque, pro renatâ repetatur Purgatio, idque toties fiat, quoties opus esse videatur, donec symptomata vel

prorsus evanuerint, vel saltem miteſcant. Poſt ſingulas Catharſes jam finitas capiat Opobalſami gutt. xx. Sacchari particulæ majori inſtillatas permixtasque, nihil ſuperbibendo. Vel Pil. è Terebinth, ex inſulâ Chio cum Saccharo cando conſectam. Opobalſamum non aſſumendum eſt niſi prægreſſis evacuationibus debitis. Hujus loco *Electuarium* è *Balſamo Lucatelli*, *Glycyrrh. pulvere*, ſemine *Aniſi* & *Terebinthina* concinnatum poterit ſubſtitui. Poſt evacuationes ſedulo conandum eſt, ut Tuſſis ſedetur, ne Pulmones jugi agitatione infirmiores evadant. Huc facit præ cæteris Syrupus jam laudatus, qui hac formula poſſit uſurpari.

℞ *Decoct. Pectoral.* ℥j. *Syr. de Mecon. Syrup. Capill. Ven. an.* ʒij. *Cap. Cochl. v. ter in die.* Medicamentum hoc ita frequenter hauſtum catarrhum in Pulmones depluentem paulatim ſiſtet; eoſque in priſtinam *ἐννεμία* reducet, niſi jampridem à naturali ſtatu nimium receſſerint. Promovebit inſuper purulentæ materiæ in iiſdem aggeſtæ concoctionem.

At vero Palmarium hujusce Morbi præſidium eſt, ut Æger quotidie Equo vehatur. Et qui ſe huic corporis exercitio ſanandum tradit, nullis jam Diætæ legibus adſtriſtus, nullo Cibi potuſve genere privandus eſt : cum in hoc uno omnis rei cardo vertatur. Quibuſdam eorum qui ex hac methodo convaluere, tumor

tumor in collo exortus est non multum à Scrophulis abludens.

Est & alia Tabis species à Tussi prognata, longè diverso anni tempore, initio sc. æstatis. Hæc Juvenes persæpe illos invadit qui debiliori sunt corporis habitu, & quorum sanguis particulis calidis acribusque refertus est. Sanguinem isti è pulmonibus per tussim exantlant, nimio meri potu priùs excalefacti. Ægri dolorem sive ægritudinem quandam in pulmonibus persentiscunt : Quæ Symptomata nisi maturè remediis appropriatis eliminantur, primo scabrities, mox & ulcus accedit, unde pus confectum demum expuitur.

Dicta jam Tabis species Venæsectione & Catharsi bis alternatim repetitis, saltem in principio, facile vincetur : Si Diætâ insuper refrigerante & incrassante utatur æger, & à carnibus in solidum abstinere.

Tertia hujus Morbi Species ortum debet materiæ Febrili in pulmones, Febre jam fatiscente, amandatæ; qui sensim infirmiores redditi à symptomatis jam memoratis vexantur.

Quandoque oritur à sanie istâ purulentâ quæ à Pleuriticis non satis copiosè per expectorationem egeritur. Quo in casu eandem, quam Empyema, Curationem postulat.

Sunt etiam qui à nimis copiosis, & debito frequentioribus evacuationibus debilitati in

quartam Tabis speciem præcipitantur. Hos calor Hecticus à Cibo potuque sumpto, sub noctem lacescit : Atque hos præ cæteris Aphthæ infestant.

De Podagra.

Exeunte Januario aut incipiente Februario, ingruit horâ ferè secundâ matutinâ, dolore pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoque verò calcaneum, suram aut talum, mox sequitur rigor cum horrore, & febricitatione aliquali, dolor gradatim intenditur (& pari passu rigor atque horror recedunt) idque in singulas horas, donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, nunc tensionem violentam, nunc morsum canis rodentis, quandoque pressuram, & coarctationem exprimens; hinc præ exquisito dolore, nec linteorum superincumbentium pondus, nec cubiculi à fortiori ambulatione concussionem ferre Podagricus valeat; dolor non sedatur, nisi ante horam secundam, tertiamve matutinam (decurso scilicet nycthemerispatio à primo appulsu) & jam leni dolore perfusus æger somno concedit, à quo evigilans, dolore multum imminuto, partem affectam tumore recenter occupatam cernit. Sequenti die, fortè etiam ad biduum, triduumve dolet nonnihil pars affecta, idque vehementius advesperascente die, levatur autem
sub

sub galli cantu. Intra paucos dies alter pes eodem dolore torquetur. Postquam utrumque pedem exercuerit dolor, qui sequuntur Paroxysmi abnormes sunt, tum quoad tempus invasionis, tum durationem; atque ex serie horum paroxymulorum, constat Paroxysmus, qui dicitur Podagræ, diuturnior breviorve pro ægri ætate in iis quæ vegetiores sunt & quos Podagra rarius invasit, diebus sæpe quatuordecim, in senioribus atque iis quos sæpius afflixit, duobus mensibus ferè desinit, iis verò qui vel annis, vel diuturniore morbi mora fracti sunt, non prius valedicit, quam æstas jam adultior eam fugaverit.

Ad quatuordecim primos dies urina coloratior est, cum sedimento rubro, & quasi arenulis referto, alvus ferè constipata est. *Appetitus* prostratio, rigor totius corporis sub vesperam, integrum Paroxysmum comitantur, recedentem Paroxysmum excipit pedis affecti inter digitos pruritus vix ferendus, unde decidunt furfures, & pedes desquamantur.

Haftenus dolor pedibus tantum fuerit infestus, cum verò vel ab indebita medicatione turbatur Podagra, vel ob diuturnam morbi pertinaciam, corporis substantia quasi in morbi fomitem pervertitur, jam manus, carpos, cubitos, genua, aliasque regiones occupat; quandoque unum, pluresve digitos distorquens fasciculo radicum pastinaeæ similes eos reddit,
motu

motu paulatim privans, tandemque concretiones, circa articularum ligamenta, tophaceas generans, cretam, vel oculos cancrorum æmulantes; nonnunquam in cubitis tumorem subalbum ciet, ferè ad ovi magnitudinem, qui sensim inflammatur cum rubore, nonnunquam femur occupans, sensum exhibet quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili, at genu exinde petens, id acrius urget, artus jam habet æger ferè undequaque contractos & impeditos, ita ut claudicet, & permoleste prorepit. Urina illam colore imitatur, quæ in diabete excernitur, dorsum aliæque partes molestè pruriunt, maximè sub horam somni.

Post multos dirosque cruciatus Paroxyismi subsequentes (naturâ partim onere materiæ peccantis, partim senio oppressâ) ægrum quoad dolorem clementius tractant, at loco doloris consueti, ægritudo quædam cum dolore ventris lassitudo spontanea, quandoque etiam propensio ad diarrhoeam superveniunt; quæ symptomata evanescunt, quoties articulos dolor fatigat, atque ita nunc dolore, nunc ægritudine, quasi alternatim laceffentibus, Paroxysmus longas moras neçtit.

Calculus Renum in quamplurimis parit hic affectus.

Fœminas perrarò infestat, easque; non nisi jam vetulas, & viragines, pueros quocque, & juvenibus minores vix adoritur. Indi-

Indicatio Curativa in eo vertitur, ut coctioni consulatur, indigestionibus sublatis, seu fit per Pharmaca, seu victûs rationem, seu exercitationem, seu alia ex istis quælibet, quæ sex res non-naturales indigitantur.

Venæsectio, Catharsis, ac Diaphoresis scopum non attingent, licet iis qui *Renum* simul *Calculo*, & exindè orto *Mictu sanguineo* laborant, non abs re erit, semel in septimanâ, alvum *Mannâ* subducere & singulis noctibus, post purgationem Paregoricum exhibere.

Medicamenta, quæ prædictæ indicationi satisfaciunt, ea sunt, quæ moderatè calent, & vel amaricant, vel linguam leniter feriunt, talia sunt, *Rad. Angelic. Enula, fol. Absinth. Cent. min. Cham. Chamap. Sc.* quibus addi possunt *Antiscorbutica* dicta, ut, *Rad. Raph. rustic. fol. Cochl. hort. Nasturt. aq. Sc.* quæ tamen parcius usurpanda veniunt, quia morbi fomiti aculeos subdunt, & calorem augment, præ istis aliis, quæ miti calore, atque amaritudine, ventriculum corroborant. Haud inutile est *Electuar.* sequens.

℞ *Conserv. Cochl. hort. ʒiſs. Absinth. Rom. flav. Aurant. an. ʒj. Angel. condit. Nuc. Mosch. cond. an. ʒſs. Theriac. Androm. ʒiij. Pulv. Ari. comp. ʒij. cum f. q. Syr. Aurant. f. Elect. de quo sumat ʒij. bis in die, superbibendo seq. Aq. distillat. Cochl. v. vel vj.*

℞ *Rad.*

℞ *Rad. Raphan. Rustic. incis. ℥iij. Cochl. hort. M. xij. Nasturt. Aq. Becabung. Salv. Menth. an. M. iv. Cort. aurant. N° vj. nuc. Mosch. cont. N° ij. Cerev. Brunsvicens. ℥xij.* distillantur organis communibus, donec solummodo ℥vj. aquæ eliciantur pro usu.

Hæc autem remedia *digestiva*, constanter, atque omni adhibitâ diligentia, assidue usurpanda, & in *paroxysmorum* intervallis præcipue in usum revocanda sunt.

Mediocritas ea in cibo observanda est, ut neque plus alimenti ingeratur, quam ventriculus concoquere valeat, neque è contra nimia abstinentia, partes eâ proportionè alimenti defraudentur, quæ earundem robur & vigorem sustinere potis est. Quoad qualitatem autem ciborum, ægri palato consulendum est, & unica ciborum specie singulis partibus vescatur; de cæteris, demptâ carne, pro libitu comedat, modo nec acria, nec sale condita sint, nec aromatis. Prandere tantum expedit, loco autem cœnæ indulgeat sibi haustum cerevisiæ alicujus tenuioris, quo calculi concretio impediatur.

Liquores optimi sunt, qui neque ad vini generositatem ascendunt, nec ad aquæ debilitatem, ne frigore suo lædant ventriculum, deprimuntve. Hujusmodi est *Cerevisia tenuis Londinensis*, aut multa aqua, cum paucò vino permixta; aqua autem pura & cruda periculosa

losa est; cum autem universa ferè corporis substantia, in podagram degeneraverit, à liquore quocunque fermentato quantumvis leni, & tenui abstineat, & utatur *Decocto Diatetico ex Sarsa, in remediorum formulis descripto*, ubi primum à paroxysmo convaluerit, per reliquum vitæ cursum.

Sin autem æger à longo, & nimio liquorum inebriantium usu, vel ab ætate provectiore, vel denique præ nimia debilitate, cibos absque vino nequeat concoquere, in pastibus haustum vini Hispanici sibi indulgeat, *Apozema Diateticum* abdicans.

Æger maximè hyemis tempore, maturè lectum petat, diluculo exurgat, animus sit tranquillus, nec nimis intentus studiis, & rebus seriis; cæteris verò omnibus, exercitatio corporis quotidiana facile palmam præripit, quæ moderata sit, & perseverans, nullo autem modo justo vehementior; quoad exercitii genus, quoties nec grandior ætas nec calculus intercedant, reliquis præferenda est equitatio constans, ac assidua in aere salubri, aut vectio in curru.

Veneris lenociniis ne indulgeat: Remedia externa nulla adhibenda.

Quamvis nihil magni in paroxysmo tentandum sit, conducet tamen fortasse per aliquot dies, ubi primum à morbo corripitur, à carnibus abstinere, juscule uti avenaceo, aut alio pari

pari alimento; fin autem spiritus animales a-
taxiam concipere apti sunt, non expedit à car-
nibus abstinere diutius, quam ventriculus ea-
rum usum adverteretur: ne quid autem vel in
quantitate vel in qualitate, ciborum aut po-
tûs peccet.

Symptomatis iis occurrendum est, à quibus
æger in paroxysmo de vita periclitatur: ho-
rum maximè familiare est, ventriculi languor,
cum ventris torminibus, tanquam à flatu: hoc
in casu, nihil æque votis respondet, ac vini
Canarensis haustulus subindè deglutitus, exer-
citio utatur æger: fin autem symptoma, indu-
cias haud ferens, mortem minitetur, modo
caput malum non impetat, ad *Laudan.* statim
confugiendum, viz. *gutt. xx.* in haustulo *Aq.*
Epidem. & in lecto ad quietem se componat:
hâc ipsâ methodo, se ab imminente morte li-
beravit autor clarissimus, ubi ex errore aliquo,
circa res sex non-naturales, in ingentem ven-
triculi ægritudinem incidit, cum vomituritio-
ne, & aliquali ventris dolore, artus interim,
ex retrocessione materiæ Podagricæ, doloris
erant expertes, ac ad motum plus solito ha-
biles. Congium nempe unum liquoris posse-
tici, vel cerevisiæ tenuis devorabat, & quam-
primum totum per vomitum rejecerit, Vini
Canar. haustulum, cui instillatæ fuerint *Lau-
dan. liq. gut. xvij.* sumebat. Quod si huic re-
medio symptoma non cedat, sudor provoce-

tur methodo & medicamentis huic usui dicatis, ad biduum, triduumve, manè & vesperi per duas tresve horas continuas.

Si autem metastasis fuerit materiæ peccantis in pulmonum lobos, liberatis artubus à dolore, & tumore, tractandum est hoc symptoma pari modo ac Peripneumonia absoluta, venæsectione scilicet repetitâ, diætâ, & remediis refrigerantibus, & incrassantibus; purgandus est insuper æger, inter venæsectiones, potionibus lenientibus: sudoris autem provocatio obest.

F I N I S.



BOOKS printed for W. and J. INNYS.

Parmacopœia Domestica, in usum eorum, qui ruri
medicinam facientes necesse habent, ut Pharmaco-
thecas privatas sibi met construant; scholiis, viri-
umque enarrationibus illustrata, & in libros duos
distributa. Per Thomam Fuller, M. D. Cantab.
12^o.

1723

———— Extemporanea, sive præscriptorum, chilias,
in quaremediorum elegantium, & efficacium paradig-
mata, ad omnes fere medendi intentiones accommodata,
candide proponuntur. Una cum viribus, operandi ra-
tione dosibus & indicibus annexis. Edit. quinta longe
auctior & emendatior. Per Tho. Fuller, M. D. Cantab.
12^o.

1714

———— Extemporanea: or a body of Medicines,
containing a thousand select præscripts, answering most
intentions of cure. To which are added useful scholia,
a catalogue of remedies, and copious index: For the
assistance of young Physicians. The third edition with
additions by the author Tho. Fuller, M. D. Cantab.
8vo.

1719

———— Bateana, in libros duos digesta: primo,
compositiones galenicæ, altero processus chymici, ordine
alphabetico exarantur: Viribus dosibusque illustrantur:
atque Catalogis & indicibus acomodantur. Curâ &
operâ Tho. Fuller, M. D. Cantab. 12^o. Lond. 1719

———— Collegii Regalis Medicorum Londinen-
sis, 12^o.

1724

———— Collegii Regalis Londini remedia omnia
succincte descripta: una cum catalogo simplicium
ordine alphabetico digestorum: quibus annexum est
manuale ad forum: nec-non pinax posographicus.
Editio quarta prioribus emendatior & auctior. Curâ
Jo. Shipton, 12^o.

1711

———— Pharmacopœia Bateana: or Bates's Dispen-
satory. Translated from the last edition of the Latin
copy publish'd by Mr. James Shipton. Containing his
choice and select recipe's, their names, composition,
preparations, virtues, uses, doses, as they are applicable
to the whole practice of Physick and Chirurgery:
The fifth edition. By William Salmon, M. D.
8vo.

1720

